

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำ

ที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony)
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง



กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำนำ

ในสถานการณ์ปัจจุบันบนโลกของเรามีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่เทคโนโลยีของมนุษย์เท่านั้นแต่รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกใบนี้ เช่น การค้นพบและตรวจพบเชื้อโรคชนิดใหม่ๆ หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าโรคอุบัติใหม่ ซึ่งการพบในแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหาย และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงชีวิตมนุษย์ด้วย จึงทำให้การสำรวจ การศึกษาวิจัย การเฝ้าระวัง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพอากาศ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งที่ใกล้ชิดมนุษย์โดยตรง และโดยอ้อม มีความสำคัญยิ่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจร ดังนั้น การเฝ้าระวังเพื่อการป้องกัน และควบคุมจึงดูเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย และสามารถที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากเกิดโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงในสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยเคยมีรายงานการพบโรคอุบัติใหม่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ หลายๆ ครั้ง เช่น โรคไข้หวัดนก (H5N1) เป็นเชื้อไวรัสที่พบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็ว และเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่มีสัตว์ในธรรมชาติเป็นพาหะ ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ป่า และสัตว์ในธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นพาหะของโรคได้ โดยโรคไข้หวัดนกมีสัตว์ในกลุ่มนกเป็นพาหะของโรค นกหลายชนิดเป็นสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นฤดูกาล และมีความสามารถในการบินได้ไกลจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้นการเฝ้าติดตามนกในธรรมชาติที่มีการอพยพย้ายแหล่งที่อยู่ แหล่งหากิน และแหล่งทำรังวางไข่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

การสำรวจแหล่งทำรังวางไข่ของนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony) ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกแหล่งสำคัญของประเทศไทย เพราะหากเกิดการระบาดของโรคขึ้นอีกครั้งเราจะสามารถควบคุม และป้องกันการระบาดของเชื้อโรคได้ทันทั่วทั้งที่ และจะสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเป็นการช่วยระงับการระบาดของเชื้อโรคมิให้ก่อเกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจของโลกได้




(นายมนต์ ห้วยเมืองแก้ว)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารบัญ

คำนำ	I
สารบัญ	II
การใช้หนังสือ	1
บทนำ	2
พื้นที่การสำรวจ	2
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่สำรวจ	5
ความหลากหลายของนกน้ำที่ทำรังวางไข่เป็นกลุ่มในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง	6
พื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ทำรังวางไข่เป็นกลุ่ม (Colony)	38
แหล่งทำรังวางไข่ที่พบในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง	45
เอกสารอ้างอิง	190
ดัชนีแหล่งทำรังวางไข่	191
คณะผู้จัดทำ	192

การใช้หนังสือ



หมายเลข 1 คือ ชื่อแหล่งทำรังวางไข่

หมายเลข 2 คือ ข้อมูลของแหล่งทำรังวางไข่ ได้แก่ ชนิดนกที่พบทำรังวางไข่ สถานที่ตั้ง พิกัดตำแหน่งของแหล่งทำรังวางไข่ และลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

หมายเลข 3 คือ ภาพแสดงสภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่

หมายเลข 4 คือ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงขอบเขตของแหล่งทำรังวางไข่ ด้วยเส้นขอบเขตสีเหลือง 

หมายเลข 5 คือ ภาพแผนที่ทางหลวงแสดงเส้นทางการเข้าถึงตำแหน่งแหล่งทำรังวางไข่แสดงด้วยรูปนก 

บทนำ

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังการระบาดของอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีโครงการวิจัยเพื่อติดตามการระบาดของโรคไข้หวัดนก ในนกที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งที่เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ สำหรับนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony) ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนก การที่นกมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน มีการผสมของมูลนกและซากนกหรือลูกนกที่ตายอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งหากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก การติดเชื้อจะเป็นไปได้ง่ายทำให้ต้องมีการเร่งสำรวจแหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการป้องกันควบคุมพื้นที่ได้ทันทั่วทั้งที่มีเมื่อมีการระบาดของโรค


การสำรวจและจัดการแหล่งทำรังวางไข่ของนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony) จัดเป็นปัญหาที่มีมิติทางภูมิศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปความแตกต่างของปัจจัยแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดชนิดพันธุ์และศักยภาพในการรองรับประชากรของพื้นที่ และการที่นกแต่ละชนิดมีช่วงความทนทานต่อความผันแปรของปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน ทำให้นกเลือกแหล่งทำรังวางไข่ในพื้นที่ต่าง ๆ กัน การสูญเสียถิ่นอาศัยและแหล่งทำรังวางไข่สามารถนำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ง่าย การปรับปรุงหรือดัดแปลงสภาพถิ่นอาศัยได้อย่างเหมาะสม จะสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ การกระจายและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ได้

ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษา จะทำให้สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ และช่วยในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการจัดการแหล่งทำรังวางไข่ (Colony) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย และการอนุรักษ์คุ้มครองชนิดพันธุ์รวมถึงพื้นที่ที่นกใช้เป็นแหล่งทำรังวางไข่ต่อไป

พื้นที่การสำรวจ

ดำเนินการสำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 ในพื้นที่ที่มีแหล่งทำรังวางไข่ของนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง รวม 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม

จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ผลการสำรวจพบแหล่งทำรังวางไข่ ทั้งหมด 72 กลุ่ม(Colony)
 ใน 18 จังหวัด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 13 จังหวัด
 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 กลุ่ม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 กลุ่ม จังหวัดพิจิตร จำนวน
 3 กลุ่ม จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 15 กลุ่ม จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม จังหวัดชัยนาท
 จำนวน 2 กลุ่ม จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 กลุ่ม จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม จังหวัดอ่างทอง
 จำนวน 6 กลุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 14 กลุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 กลุ่ม
 จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 กลุ่ม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 กลุ่ม จังหวัดนนทบุรี จำนวน
 1 กลุ่ม กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 กลุ่ม จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม จังหวัดเพชรบุรี
 จำนวน 8 กลุ่ม และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม



แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจและกลุ่มแหล่งทำรังวางไข่ของนก

แตงฟ้าดำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



ลักษณะทั่วไปของพื้นที่สำรวจ

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 เป็นช่วงที่ดำเนินการสำรวจแหล่งทำรังวางไข่ของนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony) ระยะเวลาดังกล่าวพื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแหล่งทำรังวางไข่นั้นหลายแห่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หลังจากที่มีการสำรวจพบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เกิดจากแหล่งทำรังวางไข่นั้นๆ อยู่ในพื้นที่ชุมชน หรืออยู่ในที่ดินส่วนบุคคลแล้วมีการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อทำการเกษตร

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่โดยรวมที่พบว่าเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony) คือ มีต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆ กระจายทั่วไป หรือบางครั้งพบว่าเป็นเพียงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ต้นเดียว หรือในพื้นที่เกษตร เช่น สวนผลไม้ สวนป่า อยู่ใกล้แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ซึ่งพบแหล่งทำรังวางไข่ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล จำนวน 53 แห่ง และอยู่ในที่ดินของรัฐ หรือในพื้นที่วัด จำนวน 19 แห่ง ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดพบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนาข้าว ทำนาเกลือ ทำบ่อเลี้ยงกุ้ง ทำบ่อเลี้ยงปลา รองลงมาคือเป็นพื้นที่ชุมชน



ภาพตัวอย่างสภาพทั่วไปของแหล่งทำรังวางไข่

แสดงทำรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

ความหลากหลายของนกน้ำที่ทำรังวางไข่เป็นกลุ่มในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ลักษณะทั่วไปของนกน้ำที่ทำรังวางไข่เป็นกลุ่มที่พบในการสำรวจครั้งนี้ คือนกในกลุ่มนกน้ำ จำนวน 15 ชนิด 14 สกุล 6 วงศ์ 1 อันดับ ได้แก่

อันดับนกกระสา (Order Ciconiiformes)

วงศ์นกอ้ายจ้าว (Family Anhingidae)

สกุลนกอ้ายจ้าว (Genus Anhinga) ได้แก่ นกอ้ายจ้าว

วงศ์นกกาน้ำ (Family Phalacrocoracidae)

สกุลนกกาน้ำ (Genus Phalacrocorax) ได้แก่ นกกาน้ำเล็ก

และนกกาน้ำปากยาว

วงศ์นกยาง (Family Ardeidae)

สกุลนกยาง (Genus Egretta) ได้แก่ นกยางเปีย

สกุลนกกระสาหลวง (Genus Ardea) ได้แก่ นกกระสาแดง

สกุลนกยางโทนใหญ่ (Genus Casmerodius) ได้แก่ นกยางโทนใหญ่

สกุลนกยางโทนน้อย (Genus Mesophoyx) ได้แก่ นกยางโทนน้อย

สกุลนกยางควาย (Genus Bubulcus) ได้แก่ นกยางควาย

สกุลนกยางกรอก (Genus Ardeola) ได้แก่ นกยางกรอกพันธุ์ขาว

สกุลนกแขวก (Genus Nycticorax) ได้แก่ นกแขวก

วงศ์นกช้อนหอย (Family Threskiornithidae)

สกุลนกช้อนหอยดำเหลือบ (Genus Plegadis) ได้แก่ นกช้อน

หอยดำเหลือบ

สกุลนกช้อนหอยขาว (Genus Threskiornis) ได้แก่ นกช้อนหอยขาว

วงศ์นกกระทุง (Family Pelecanidae)

สกุลนกกระทุง (Genus Pelecanus) ได้แก่ นกกระทุง

วงศ์นกกระสา (Family Ciconiidae)

สกุลนกกาบบัว (Genus Mycteria) ได้แก่ นกกาบบัว

สกุลนกปากห่าง (Genus Anastomus) ได้แก่ นกปากห่าง

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แต่ส่งตำราวังวังของนกน้ำเต้าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

วงศ์นกอ้ายจ้าว : Family Anhingidae ;

สกุลนกอ้ายจ้าว : Genus Anhinga ;

นกอ้ายจ้าว ; Darter (*Anhinga melanogaster* Pennant, 1769.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดใหญ่มาก (85-97 ซม.) ปากสีเหลืองตรงยาว ปลายแหลม หัวเล็ก คอยาวมากเรียวเล็ก ปีกยาว ปลายปีกค่อนข้างมน หางแข็ง ปลายหางเป็นหางพลั่ว ขาค่อนข้างสั้น ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีเหมือนกัน ตัวเต็มวัยหัวและคอสีน้ำตาล มีลายสีขาวคาดจากคางถึงข้างคอ ลำตัวสีน้ำตาลดำ ช่วงไหล่ คอด้านบน และลำตัวด้านบนมีลายขีดสีเทาแกมสีเงิน ตัวไม่เต็มวัยสีจางกว่าตัวเต็มวัย หัวและคอสีขาว ลำตัวสีน้ำตาล

ถิ่นอาศัย ; อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำ เช่น บึง หนอง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทะเลสาบ แหล่งน้ำขนาดใหญ่

อาหาร ; ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ ที่ขนาดไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไป

การสืบพันธุ์ ; นกอ้ายจ้าวผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนหรือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มตามต้นไม้ใหญ่ ทั้งสองเพศช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง และช่วยกันฟักไข่ ในรังมีไข่ 3-5 ฟอง ลูกนกจะฟักออกจากไข่หลังจาก 27-30 วัน

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพ หายากหรือพบบ่อยในบางพื้นที่ ตามกฎหมายจัดนกอ้ายจ้าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม Thailand red data : birds จัดนกอ้ายจ้าวอยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ (EN) และ IUCN Red List 2012 จัดนกอ้ายจ้าวอยู่ในสถานะถูกคุกคาม (NT)

แสงสร้างรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



แสดงตำราวิจัยของนกน้ำดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

วงศ์นกกา : Family Phalacrocoracidae ;

สกุลนกกา : Genus Phalacrocorax ;

นกกาเล็ก ; Little Cormorant (*Phalacrocorax niger* (Vieillot) 1817.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลาง (50-54.5 ซม.) มีถุงคางสีขาว คอยาว ปานกลาง ปลายปีกและปลายหางมน ขาค่อนข้างสั้น ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาลดำ ขนคลุมขนปีกสีเทาเข้มถึงดำ ช่วงฤดูผสมพันธุ์ ฤดูใดคางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีขนขาวขึ้นแซมบริเวณลำตัวด้านบนและด้านข้างของหัว ตัวไม่ได้มีวัยขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาลเข้ม ขนคลุมขนปีกสีเทาฤดูใด คางสีขาว ปากสีเหลืองปนเทา

ถิ่นอาศัย ; ป่าชายเลน หนอง บึง ทะเลสาบ และแหล่งน้ำต่างๆ

อาหาร ; อาหารหลักของนกกาเล็กคือปลาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังกิน กบ เขียด กุ้ง แมลง และกินพืชบางชนิด

การสืบพันธุ์ ; นกกาเล็กผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน ตุลาคม ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มตามต้นไม้ ทั้งสองเพศจะช่วยกันสร้างรัง และกกไข่ ในรังมีไข่ 3-5 ฟอง ลูกนกจะฟักออกจากไข่หลังจาก 22-26 วัน

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น พบได้บ่อยทั่วทุกภาค ตามกฎหมายจัดนกกาเล็ก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกกาเล็กอยู่ใน สภาวะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)

แสงสร้างรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



นกกาน้ำปากยาว ; Indian Cormorant (*Phalacrocorax fuscicollis* Stephens, 1826.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ (61-68 ซม.) ปากยาว 5-6 ซม. คอค่อนข้างยาวปลายปีกและปลายหางมน คอค่อนข้างสั้น ทั้งสองเพศมีลักษณะสีเหมือนกัน ปากสีเทาถึงดำ กระจกใต้คางสีเหลือง มีแถบสีขาวคั่นระหว่างกระจกใต้คางและคอ ลำตัวมีสีดำเป็นมัน ปีกสีดำแกมน้ำตาลเข้ม ช่วงฤดูผสมพันธุ์กระจกใต้คางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีแถบสีขาวคั่นระหว่างกระจกใต้คางและคอ แต่ด้านข้างของหัวหรือบริเวณขมับจะมีแถบสีขาวชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากนกกาน้ำชนิดอื่น

ถิ่นอาศัย ; ป่าชายเลน หนองบึงในที่ราบ

อาหาร ; อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ปลามากกว่า 95% สัตว์อื่นๆ เช่น กุ้งฝอย กบ เขียด สัตว์น้ำอื่นๆบ้าง และแมลง

การสืบพันธุ์ ; นกกาน้ำปากยาวผสมพันธุ์ในช่วงกลางฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ตัวผู้จะเป็นตัวหาวัสดุในการทำรัง แต่ทั้งสองเพศจะช่วยกันสร้างรัง รังมีไข่ 3-5 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกันฟักไข่ ลูกนกจะออกจากไข่หลังจาก 24-28 วัน

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนัก ตามกฎหมายจัดนกกาน้ำปากยาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม Thailand red data : birds จัดนกกาน้ำปากยาวอยู่ในสถานะถูกคุกคาม (NT) และ IUCN Red List 2012 จัดนกกาน้ำปากยาวอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)

แสงสร้างรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



วงศ์นกยาง : Family Ardeidae ;

สกุลนกยาง : Genus Egretta ;

นกยางเปี่ย ; Little Egret (*Egretta garzetta* (Linnaeus) 1758.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลาง (50-65 ซม.) ปากยาวตรงสีดำ บริเวณมุมปากมีขนเล็กน้อยขนนี้อาจยาวถึงกลางปาก คอยาว ลำตัวสีขาว ปีกยาว ปลายปีกมน ขายาว แข้งสีดำ นิ้วตีนสีเหลือง ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีเหมือนกัน ช่วงฤดูผสมพันธุ์บริเวณท้ายทอยมีขนสีขาว 2 เส้น ยาวประมาณ 10 ซม. ลักษณะคล้ายผมเปียของคน นอกจากนี้คอและตะโพกมีขนลักษณะแตกเป็นฝอยละเอียด ขนเหล่านี้จะหลุดร่วงไปเมื่อพ้นฤดูผสมพันธุ์

ถิ่นอาศัย ; พบได้ทั่วไปตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม เช่น ชายเลน นาเกลือ

อาหาร ; อาหารมากกว่า 70 % เป็นปลาชนิดต่างๆ อาหารชนิดอื่นๆ ได้แก่ กบ เขียด กุ้งฝอย แมลงต่างๆ

การสืบพันธุ์ ; นกยางเปี่ยส่วนใหญ่ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน แต่มีส่วนน้อยที่พบผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ นกเพศผู้จะหาวัสดุส่งให้เพศเมียและช่วยกันสร้างรัง รังจะถูกสร้างบนต้นไม้ มักทำรังเป็นกลุ่มและอยู่รวมกับนกอีกหลายชนิด รังมีไข่ 2-5 ฟอง ลูกนกจะออกจากไข่หลังจาก 25-27 วัน

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น และบางส่วนของนกอพยพมาในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบได้บ่อยทั่วทุกภาค ตามกฎหมายจัดนกยางเปี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกยางเปี่ยอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)

แสงตำรังวางไข่ของนกน้ำที่ตำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



สกุลนกกระสาขาว : Genus Ardea ;

นกกระสาแดง ; Purple Heron (*Ardea purpurea* Linnaeus, 1766.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดใหญ่มาก (78-97 ซม.) ปากเรียวยาว ปลายปากแหลม หัวค่อนข้างเล็ก คอยาวมาก ปีกยาวปลายปีกมน ขาวมาก หางสั้น ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ตัวเต็มวัยกระหม่อนและท้ายทอยสีดำ มีขนสีดำสองเส้นออกจากกระหม่อนไปถึงท้ายทอยเป็นหางเปีย คอสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลเข้มออกดำ ตัวไม่เต็มวัยลำตัวสีน้ำตาลออกเทา ไม่มีเปีย

ถิ่นอาศัย ; พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ เช่น บึง หนอง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ บางครั้งพบตามชายฝั่งทะเล

อาหาร ; อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู กบ เขียด พบกินแมลงบ้าง

การสืบพันธุ์ ; นกกระสาแดงผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน แต่บางท้องถิ่นอาจพบทำรังเกือบตลอดทั้งปี ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มบนต้นไม้ขนาดใหญ่ และพบอยู่ร่วมกับนกหลายชนิด ทั้งสองเพศช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง รังมีไข่ 3-4 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกันฟักไข่ ประมาณ 27-29 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น พบได้ไม่บ่อย แต่ที่สามารถพบได้บ่อยเป็นนกที่อพยพมานอกช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตามกฎหมายจัดนกกระสาแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม Thailand red data : birds จัดนกกระสาแดงอยู่ในสถานะมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ (VU) และ IUCN Red List 2012 จัดนกกระสาแดงอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)



สกุลนกยางโทนใหญ่ : Genus Casmerodius ;

นกยางโทนใหญ่ ; Great Egret (*Casmerodidus albus* (Linnaeus) 1758.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดใหญ่ (85-102 ซม.) จัดเป็นนกยางสีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ปากยาวตรงสีเหลือง และสีดำในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ลำคอยาวมาก ปลายปีกมน ขาค่อนข้างยาว นิ้วยาว ขนปกคลุมลำตัวทั้งหมดสีขาว ผิวหนังบริเวณใบหน้ามีสีเหลืองแกมเขียว แข็งและนิ้วสีดำ แต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ผิวหนังบริเวณใบหน้าเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินแกมเขียว แข็งอาจเปลี่ยนเป็นสีแดง

ถิ่นอาศัย ; พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ เช่น บึง หนอง พุงนา อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หรือบริเวณป่าชายเลน

อาหาร ; อาหารหลักได้แก่ปลาชนิดต่างๆ อาจเป็นปลาน้ำจืด น้ำกร่อย หรือน้ำเค็ม นอกจากนั้นยังกิน กุ้ง ปู กบ เขียด แมลง แต่กินเป็นส่วนน้อย

การสืบพันธุ์ ; นกยางโทนใหญ่ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทำรังเป็นกลุ่มตามต้นไม้ และอาจอยู่รวมกลุ่มกับนกหลายชนิด ทั้งสองเพศจะช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง รังมีไข่ 3-5 ฟอง ทั้งสองเพศจะผลัดกันฟักไข่ ใช้เวลาฟักไข่ 25-28 วัน ลูกนกจึงจะออกจากไข่

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น และบางส่วนเป็นนกอพยพในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ตามกฎหมายจกนกยางโทนใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกยางโทนใหญ่อยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)



สกุลนกยางโทนน้อย : Genus *Mesophoyx* ;

นกยางโทนน้อย ; Intermediate Egret (*Mesophoyx intermedia* (Wagler) 1829.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลาง-ใหญ่ (65-72 ซม.) ปากตรงยาวสีเหลือง ผิวหนังบริเวณใบหน้าสีเหลืองแกมเขียว คอยาว ลำตัวสีขาว ปลายปีกมน ขาวยาว แข็งและนิ้วสีดำ ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปลายปากเป็นสีดำ บริเวณอกและหลังมีขนละเอียดสีขาวแตกเป็นฝอย

ถิ่นอาศัย ; อาศัยตามแหล่งน้ำในทุ่งนา บึง ทะเลสาบ ป่าชายเลน และนาเกลือ **อาหาร** ; อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ปลา โดยเฉพาะปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำไม่ลึกมาก นอกจากนั้นยังกินสัตว์น้ำอื่นๆและแมลงบ้าง

การสืบพันธุ์ ; นกยางโทนน้อยมีช่วงฤดูผสมพันธุ์ค่อนข้างแปรผันไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และอาหาร ทำรังเป็นกลุ่มตามต้นไม้สูงหรือตามป่าพง อ้อ กก เป็นต้น และพบอยู่ร่วมกับนกหลายชนิด ทั้งสองเพศช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง รังมีไข่ 2-5 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกันฟักไข่ประมาณ 24-27 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่ และเริ่มหัดบินเมื่ออายุประมาณ 35 วัน

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น แต่ส่วนมากเป็นนกที่อพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ตามกฎหมายจัดนกยางโทนน้อยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกยางโทนน้อยอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)



สกุลนกยางควาย : Genus Bubulcus ;

นกยางควาย ; Cattle Egret (*Bubulcus ibis* (Linnaeus) 1758.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลาง (48-53 ซม.) ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ปากยาวปานกลางและโค้งเล็กน้อย สีเหลือง ผิวหนังบริเวณใบหน้าเป็นสีเหลือง แกมเขียว หัวกลม คอเรียวยาวปานกลาง ปลายปีกมน ขายาวปานกลาง แข้ง และนิ้วเป็นสีดำหรือเหลืองแกมเขียว ลำตัวสีขาว ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปาก ผิวหนัง บริเวณใบหน้า ขา และนิ้วเป็นสีแดง ขนบริเวณหัว คอ และหลังเป็นสีส้ม

ถิ่นอาศัย ; พบได้ตามทุ่งหญ้า ทุ่งนา หรือพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ และพบบ่อยมากหากินร่วมกับฝูงปศุสัตว์

อาหาร ; ส่วนใหญ่เป็นสัตว์พวกแมลง เช่น ตั๊กแตน จิ้งหรีด เหย็บ หนวด เป็นต้น และสัตว์จำพวก กบ เขียด สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เช่น ลูกแย้ จิ้งเหลน

การสืบพันธุ์ ; นกยางควายผสมพันธุ์ช่วงปลายฤดูร้อนต่อฤดูฝนระหว่างเดือน เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังตามต้นไม้ มักทำรังรวมกันเป็นกลุ่มรวมกับนก หลายชนิด เพศผู้จะหาวัสดุเศษเมื่อยสร้างรัง รังมีไข่ 3-5 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกัน ฟักไข่ ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 21-25 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น บางส่วนเป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ตามกฎหมายจัดนกยางควายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกยางควายอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)

แสงสว่างวาบของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



สกุลนกยางกรอก : Genus *Ardeola* ;

นกยางกรอกพันธุ์ขาว ; Javan Pond Heron (*Ardeola speciosa* (Horsfield) 1821.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลาง (44-46 ซม.) ปากยาวตรง หัวค่อนข้างใหญ่ คอยาวพอประมาณ ปีกยาว ปลายปีกมน ขายาวปานกลาง นิ้วยาว ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล หัวและอกสีน้ำตาลออกเหลืองมีลายขีดสีน้ำตาลเข้ม ท้องและปีกด้านล่างสีขาว ช่วงฤดูผสมพันธุ์หัวและคอสีน้ำตาลออกเหลืองไม่มีลาย หลังสีน้ำตาลเข้ม อกสีส้ม บริเวณท้ายทอยมีขนเปียสีน้ำตาลออกเหลือง 2 เส้น

ถิ่นอาศัย ; พบหากินบริเวณทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

อาหาร ; ได้แก่สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง กบ เขียด แมลงต่างๆ

การสืบพันธุ์ ; นกยางกรอกพันธุ์ขาวผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มตามต้นไม้ ทั้งสองเพศช่วยกันสร้างรัง รังมีไข่ 3-5 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกันฟักไข่ ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 20-22 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น และบางส่วนอพยพมานอกช่วงฤดูผสมพันธุ์ กฎหมายจัดนกยางกรอกพันธุ์ขาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกยางกรอกพันธุ์ขาวอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)



สกุลนกแขวก : Genus *Nycticorax* ;

นกแขวก ; Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax* (Linnaeus) 1758.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลาง (53-65 ซม.) ปากตรงสีดำ โคนปากค่อนข้างแบน หัวใหญ่ ตาใหญ่ ม่านตาสีแดง ปลายปีกมน แข็งและนิ้วสีเหลืองอมเขียว ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ตัวเต็มวัยหัวและลำตัวสีน้ำตาลเงินหม่นเกือบดำและมักออกเหลืองเขียว ออกสีเทา ท้องสีขาว ในฤดูผสมพันธุ์มีขนยาวสีขาวเส้นเล็กๆ 2-3 เส้นบริเวณท้ายทอย ขาเปลี่ยนเป็นสีชมพู

ถิ่นอาศัย ; อาศัยตามพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ

อาหาร ; อาหารส่วนใหญ่เป็นพวกปลา มากกว่า 80 % รองลงมาได้แก่ กุ้งฝอย และปูนา นอกจากนี้ยังพบว่ากินหนูนา หนูหริ่ง กบ เขียด และแมลงด้วย

การสืบพันธุ์ ; นกแขวกผสมพันธุ์เกือบตลอดทั้งปี แต่ส่วนมากจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาวระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มบนต้นไม้ และพบบ่อยรวมเป็นกลุ่มกับนกหลายชนิด ทั้งสองเพศช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง รังมีไข่ 2-4 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกันฟักไข่ประมาณ 21-24 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น และบางส่วนอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ตามกฎหมายจัดนกแขวกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกแขวกอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)

แสงสว่างรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



วงศ์นกช้อนหอย : Family Threskiornithidae ;

สกุลนกช้อนหอยดำเหลือบ : Genus Plegadis ;

นกช้อนหอยดำเหลือบ ; Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus* (Linnaeus) 1766.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดกลาง-ใหญ่ (55-65 ซม.) ปากโค้งยาวสีเหลืองคล้ำ หัว คอ และลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม รอบใบหน้ามีเส้นสีขาวแกมฟ้า มีลายขีดสีขาวกระจายที่หัวและคอ ปีกและหลังตอนท้ายถึงหางเขียวเข้มเป็นมัน เหลือบสีทองแดง และม้วน แข็งและตีนสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้ม

ถิ่นอาศัย ; อาศัยตามพื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งนา บึง แหล่งน้ำขนาดใหญ่ หาดโคลน ชายทะเล

อาหาร ; อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ สัตว์น้ำ เช่น ปลา ปู หอย กบ เขียด กุ้ง นอกจากนี้ ยังพบกินแมลงด้วย

การสืบพันธุ์ ; นกช้อนหอยดำเหลือบผสมพันธุ์ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มบนต้นไม้สูงประมาณ 3-5 เมตร อาจพบ ทำรังรวมกับนกหลายชนิด รังทำด้วยกิ่งไม้ต่างๆ และเสริมรังด้วยใบไม้สด รังมีไข่ 2-4 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ในช่วงเวลากลางคืน ส่วนเพศผู้จะฟักไข่ในช่วงกลางวัน ฟักไข่ประมาณ 21 วัน ลูกนกจึงออกไข่ และจะสามารถบินออกจากรังตามพ่อแม่ ได้เมื่ออายุประมาณ 7 สัปดาห์

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบได้ ไม่บ่อยนัก ตามกฎหมายจัดนกช้อนหอยดำเหลือบเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกช้อนหอยดำเหลือบอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)



สกุลนกช้อนหอยขาว : Genus *Threskiornis* ;

นกช้อนหอยขาว ; Black-headed Ibis (*Threskiornis melanocephalus* (Latham) 1790.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดใหญ่ (75-77 ซม.) ปากยาวโค้งสีดำ ลำตัวสีขาว ตัดกับหัวและคอซึ่งเป็นผิวน้ำสีดำและมีขนน้อย ขนโคนปีกสีเทา ขาวยาวปานกลาง แข็งและนิ้วสีดำ ตัวไม่เต็มวัยมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย แต่บริเวณหัวปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล คอมีขนสีขาวปกคลุมบางส่วน ขนปลายปีกด้านนอกตอนปลายเป็นสีดำ

ถิ่นอาศัย ; อาศัยและหากินตามพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำ เช่น บึง หนอง คลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำขนาดใหญ่ ชายเลน

อาหาร ; อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ ปลา ปู หอย กบ นอกจากนี้ยังพบว่ากินแมลงบริเวณแหล่งน้ำด้วย

การสืบพันธุ์ ; นกช้อนหอยขาวผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน (โอภาส, 2543) อย่างไรก็ตามรายงานขององค์การสวนสัตว์และวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานถึงพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกช้อนหอยขาวที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวพบว่าฤดูการผสมพันธุ์เริ่มในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ก็พบนกช้อนหอยขาวทำรังวางไข่ด้วยเช่นกัน นกช้อนหอยขาวมักทำรังเป็นกลุ่มตามต้นไม้ และอาจอยู่ร่วมกับนกหลายชนิด ทั้งสองเพศช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง บางครั้งพบทำรังตามพุ่มหญ้าบริเวณใกล้หรือในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งหากิน ในรังมีไข่ประมาณ 3-5 ฟอง ทั้งสองเพศลัดกันฟักไข่ ฟักไข่ประมาณ 29-30 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพมาในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบได้ไม่บ่อย ตามกฎหมายจัดนกช้อนหอยขาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม Thailand red data : birds จัดนกช้อนหอยขาวอยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ (EN) และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกช้อนหอยขาวอยู่ในสถานะถูกคุกคาม (NT)



วงศ์นกกระทุง : Family Pelecanidae ;

สกุลนกกระทุง : Genus Pelecanus ;

นกกระทุง ; Spot-billed Pelican (*Pelecanus philippensis* Gmelin, 1789.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดใหญ่มาก (140 ซม.) ปากยาว สีเนื้อและมีลายจุดสีน้ำตาลตามขอบขากรรไกรบน ปลายปากเป็นปากขอเล็กน้อย ใต้คางมีขนาดใหญ่ แม้ตั้งแต่ปลายขากรรไกรล่างจนถึงคอหอย คอยาว ปีกกว้าง หางสั้น ขาสั้น ดินมีผังผืดนิ้วแบบตีนปัดเต็ม ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีเหมือนกัน ตัวเต็มวัยฤดูใต้คางสีเนื้อ มีสีน้ำตาลหรือสีชมพูแซม ตาสีขาวถึงเหลืองแกมเทา ลำตัวสีออกขาว อาจมีสีเทาหรือน้ำตาลแซมโดยเฉพาะทางลำตัวด้านล่าง ขนปลายปีกสีดำ ขนกลางปีกทั้งด้านบนและด้านล่างสีน้ำตาลเข้ม ขาและนิ้วสีน้ำตาลเข้มหรือสีเทาเข้ม ในฤดูผสมพันธุ์ท้ายทอยจะมีขนสั้นๆ สีน้ำตาลงอกออกมาเล็กน้อย หลังตอนท้ายสีข้าง ก้น และขนคลุมโคนขนหางด้านล่างเป็นสีชมพู ตัวไม่เต็มวัยจะมีลักษณะและสีคล้ายตัวเต็มวัย แต่ลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลขีด ลำตัวด้านล่างสีขาวแซมสีน้ำตาล

ถิ่นอาศัย ; อาศัยและหากินเป็นฝูงตามแหล่งน้ำ เช่น บึง ทะเลสาบ แม่น้ำ ขนาดใหญ่ ชายฝั่งทะเล

อาหาร ; อาหารส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลา

การสืบพันธุ์ ; นกกระทุงผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มบนกิ่งของต้นไม้ขนาดใหญ่และสูง และอาจอยู่รวมกับนกหลายชนิด ทั้งสองเพศช่วยกันทำรังและฟักไข่ ในรังมีไข่ 2-4 ฟอง ใช้เวลาฟักนานประมาณ 30 วัน ลูกนกจะเริ่มบินเมื่ออายุประมาณ 35-50 วันหลังจากไข่ และลูกนกจะทิ้งรังไป

สถานภาพ ; เป็นนกประจำถิ่นและเป็นนกอพยพมายังประเทศไทยในช่วงฤดูผสมพันธุ์ หายากและมีปริมาณน้อยมาก ตามกฎหมายจัดนกกระทุงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม Thailand red data : birds จัดนกกระทุงอยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธุ์ (EN) และ IUCN Red List 2012 จัดนกกระทุงอยู่ในสถานะถูกคุกคาม (NT) การทำรังวางไข่ของนกกระทุงในประเทศไทย เป็นนกกระทุงในสวนสัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อยและจับคู่ผสมพันธุ์กันภายในสวนสัตว์ ซึ่งจะมีนกน้ำหลายชนิดทำรังรวมกลุ่มกัน



แต่ส่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

วงศ์นกกระสา : Family Ciconiidae ;

สกุลนกกาบบัว : Genus Mycteria ;

นกกาบบัว ; Painted Stork (*Mycteria leucocephala* (Pennant) 1769.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดใหญ่มาก (93-102 ซม.) ปากยาว ปลายปากมนโค้งเล็กน้อย หัวเล็ก คอยาว ปีกกว้างและยาว หางสั้น ขาวยาว ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ตัวเต็มวัยปากสีเหลืองลำตัวสีขาว บริเวณปีกมีสีขาวสลับดำ ออกและปลายหางมีแถบสีดำ ขนบริเวณตะโพกเป็นสีชมพู ขาและนิ้วสีน้ำตาลหรือสีแดง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ผิวหนังบริเวณใบหน้าเป็นสีแดง

ถิ่นอาศัย ; อาศัยตามพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆ เช่น หนอง บึง ทะเลสาบ หาดโคลนริมทะเล ป่าชายเลน เป็นต้น

อาหาร ; อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู หอย นอกจากนั้นยังพบกินแมลงและตัวหนอนด้วย

การสืบพันธุ์ ; นกกาบบัวผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน มักทำรังรวมกันเป็นกลุ่มบนยอดต้นไม้สูงใหญ่ ทั้งสองเพศช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง รังมีไข่ 2-4 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกันฟักไข่ ประมาณ 30-31 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่

สถานภาพ ; เป็นนกอพยพมาทำรังวางไข่ในประเทศไทย บางส่วนเป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ หายากและมีปริมาณน้อย ตามกฎหมายจัดนกกาบบัวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม Thailand red data : birds จัดนกกาบบัวอยู่ในสถานะมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ (VU) และ IUCN Red List 2012 จัดนกกาบบัวอยู่ในสถานะถูกคุกคาม (NT)

แสงสร้างรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



สกุลนกปากห่าง : Genus *Anastomus* ;

นกปากห่าง : Asian Openbill (*Anastomus oscitans* (Boddaert) 1783.)

ลักษณะทั่วไป ; เป็นนกขนาดใหญ่ (68-81 ซม.) ปากยาวใหญ่ ปลายปากแหลม บริเวณใกล้กับปลายขากรรไกรล่างเว้าลง คอยาว ปีกกว้างและยาว หางสั้น ขายาว ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ตัวเต็มวัยในฤดูผสมพันธุ์ลำตัวด้านบนและด้านล่างมีสีขาว ขนปลายปีก หาง และตะโพกเป็นสีดำ ช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์สีตามตัวเป็นสีเทาอ่อน แข็งและตีนสีชมพูคล้ำ

ถิ่นอาศัย ; แหล่งน้ำจืดต่างๆ เช่น ทุ่งนา หนองน้ำ ชายบึง เป็นต้น

อาหาร ; อาหารหลักเป็นสัตว์จำพวกหอย เช่น หอยโข่ง หอยเชอรี่ รองลงมาเป็น ปลา ปู กบ เขียด นอกจากนั้นยังพบว่ากินแมลง ตัวหนอน และสัตว์เลื้อยคลาน บางชนิด เช่น งู เป็นต้น

การสืบพันธุ์ ; นกปากห่างผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และมักพบอยู่ร่วมกับนกหลายชนิด ทั้งสองเพศช่วยกันหาวัสดุและสร้างรัง รังมีไข่ 1-5 ฟอง ทั้งสองเพศผลัดกันฟักไข่ ประมาณ 27-29 วัน ลูกนกจึงออกจากไข่

สถานภาพ ; ในอดีตเป็นนกอพยพมาทำรังวางไข่ในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นนกประจำถิ่นด้วย ตามกฎหมายจัดนกปากห่างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตาม IUCN Red List 2012 จัดนกปากห่างอยู่ในสถานะยังไม่น่าเป็นห่วง (LC)

แสงสว่างรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



พื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงวางไข่เป็นกลุ่ม (Colony)

นกอ้ายยั่ว พบแหล่งทำรังวางไข่จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วังเป็ด
2. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ เกาะวัด และบึงน้ำใส 1
3. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์
4. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งมหาตไทย

นกกาน้ำเล็ก พบแหล่งทำรังวางไข่จำนวน 13 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเป็ด และบ้านกะพง
2. พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ชาณุ
3. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 14 กลุ่ม ได้แก่ เกาะดร.สมิธ เกาะวัด ประมงเชิง พาณิชัย เนินระฆัง แหลมนา วังมหากร บ้านหัวพง วัดวังมหากร บ้านผู้ใหญ่เหือง บ้านผู้ใหญ่เหือง 2 เขาพนมเศษ พนมเศษ ท่าตะโก บึงน้ำใส 2
4. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์
5. พื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ท่าทราย
6. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์
7. จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งบ้านตาล ทุ่งโคกพุทรา และ ทุ่งวัดจันทาราม
8. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ วัดตาลเอน และ ทุ่งวัดเจ้าปลุก
9. พื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
10. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ซาฟารีเวิลด์
11. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู
12. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ดิกันกแอ่นกินรัง แหลมผักเป็ด และ บ้านเจ้าหาด
13. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

นกกาน้ำปากยาว พบแหล่งทำรังวางไข่จำนวน 8 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเป็ด และบ้านกะพง
2. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เกาะดร.สมิธ เกาะวัด ประมงเชิง พาณิชัย วัดวังมหากร บ้านผู้ใหญ่เหือง บ้านผู้ใหญ่เหือง 2

3. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์
4. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ หุ่นวัดจันทาราม หุ่นมหาดไทย
5. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดตาลเอน
6. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู
7. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ แหลมผักเบี้ย
8. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

นกยางเปี้ย พบแหล่งทำรังวางไข่จำนวน 17 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเปิด และบ้านกะพวง
2. พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ชาญ
3. พื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ นครไชยबर
4. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 15 กลุ่ม ได้แก่ เกาะดร.สมิธ เกาะวัด ประมงเชิงพานิชย์ เนินระฆัง แหลมนา วังมหกร บ้านหัวพวง วัดวังมหกร บ้านผู้ใหญ่เทือง บ้านผู้ใหญ่เทือง 2 เขาพนมเศษ พนมเศษ ท่าตะโก บึงน้ำใส 1 บึงน้ำใส 2
5. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์
6. พื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ท่าทราย และวัดโคกสุข
7. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านลุงบุญลือ
8. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์
9. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ หุ่นมหาดไทย หุ่นบ้านตาล หุ่นโคกพุทรา หุ่นวัดจันทาราม และเกาะนกบ้านริ้วหว้า
10. พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านท่าเสด็จ และหุบสระแก้ว
11. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ หุ่นบางเสาธง วัดตาลเอน และหุบเจ้าปลุก
12. พื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
13. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดไผ่ล้อม
14. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ หุ่นลำปลาทิว
15. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู
16. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ บ้านยายแข่ง ตึกนกแอ่นกินรัง บ้านแยก บ้านสะพานหิน แหลมผักเบี้ย วัดพิบูลแก้ว บ้านเจ้าหาด บ้านม่วง
17. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

นกกระสาแดง พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะวัด

นกยางโทนใหญ่ พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 13 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเป็ด บ้านกะพวง
2. พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ขาณุ
3. พื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ นครไชยबर
4. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ เกาะดร.สมิท เกาะวัด ประมงเชิงพานิชย์ แหลมนา เนินระฆัง วังมหาร บ้านหัวพวง
5. พื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ท่าทราย
6. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์
7. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ หูมหาดไทย และทุ่งวัดจันทาราม
8. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ วัดตาลเอน และทุ่งวัดเจ้าปลุก
9. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดไผ่ล้อม
10. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ หูมลำปลาทิว
11. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู
12. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ตึกนกแอ่นกินรัง แหลมผักเบี้ย วัดพิกุลแก้ว และบ้านเจ้าหาด
13. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

นกยางโทนน้อย พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเป็ด และบ้านกะพวง
2. พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ขาณุ
3. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ เกาะดร.สมิท เกาะวัด วังมหาร บ้านหัวพวง และวัดวังมหาร
4. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์
5. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ แหลมผักเบี้ย

นกอพยพ พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 17 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเป็ด และบ้านกะพง
2. พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ขาญ
3. พื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ นครไชยวรร
4. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ เกาะตร.สมิธ เกาะวัด ประมงเชิงพานิชย์ เนินระฆัง แหลมนา วังมหกร บ้านหัวพง วัดวังมหกร เขาพนมเศษพนมเศษ บึงน้ำใส 1 และบึงน้ำใส 2
5. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์
6. พื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ท่าทราย และวัดโคกสุก
7. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านลุงบุญลือ
8. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์
9. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งมหาตไทย ทุ่งวัดจันทร์าราม และเกาะนกบ้านรื้อหัว
10. พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ บ้านท่าเสด็จ ทุ่งสระแก้ว และหนองสาหร่าย
11. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งบางเสาธง วัดตาลเอน และทุ่งเจ้าปลุก
12. พื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
13. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งวัดบัวหลวง
14. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งลำปลาทิว
15. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู
16. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ บ้านยายแข่ง ตึกนกแอ่นกินรัง บ้านแยก บ้านสะพานหิน แหลมผักเบี้ย และบ้านเจ้าหาด
17. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

นกยางกรอกพันธุ์ขาว พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 11 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดโคกสุก
2. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านลุงบุญลือ
3. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์

4. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งมหาไทย ทุ่งบ้านตาล และ ทุ่งวัดจันทาราม
5. พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านท่าเสด็จ
6. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งบางเสาธง วัดตาลเอน และทุ่งเจ้าปลุก
7. พื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
8. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งลำปลาทิว
9. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานีตากอากาศบางปู
10. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ บ้านยายแข่ง ตึกนกแอ่นกินรัง บ้านแยก บ้านสะพานหิน แหลมผักเบี้ย และบ้านเจ้าหาด
11. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

นกแขวก พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 15 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเป็ด และบ้านกะพง
2. พื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ นครไชยวรร
3. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ เกาะตร.สมิธ เกาะวัด เนินระฆัง วังมหารกร บ้านหัวพวง พนมเศษ บึงน้ำใส 1 และบึงน้ำใส 2
4. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์
5. พื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ท่าทราย และวัดโคกสุก
6. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านลุงบุญลือ
7. พื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ วัดห้วยจันทร์
8. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งมหาไทย ทุ่งบ้านตาล ทุ่งโคกพุทรา และทุ่งวัดจันทาราม
9. พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านบางสระแก
10. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ บางเสาธง วัดตาลเอน และ ทุ่งเจ้าปลุก
11. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ วัดไผ่ล้อม และทุ่งวัดบัวหลวง
12. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งลำปลาทิว
13. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานีตากอากาศบางปู
14. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ แหลมผักเบี้ย
15. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

นกช่อนหอยดำเหลือง พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ เกาะตร.สมิธ เกาะวัด ประมงเชิงพาณิชย์ เนินระฆัง แหลมนา วังมหากร และบ้านหัวพวง

นกช่อนหอยขาว พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ เกาะตร.สมิธ และเนินระฆัง

นกกระทง พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ซาฟารีเวิลด์

นกกาบบัว พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์
2. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ซาฟารีเวิลด์

นกปากห่าง พบแหล่งทำรังวางไข่ จำนวน 15 พื้นที่ ได้แก่

1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ บ้านวังเป็ด บ้านกะพวง วัดพรหมเกษร และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
2. พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ คลองขลุง
3. พื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ บ้านหนองหลุม นครไชยบุรี และบ้านวังจิก
4. พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ ประมงเชิงพาณิชย์ แหลมนา เขาพนมเศษ พนมเศษ บึงน้ำใส 1 และบึงน้ำใส 2
5. พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์
6. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ บ้านลุงบุญลือ
7. พื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งมหาตไทย ทุ่งบ้านตาล ทุ่งโคกพุทรา ทุ่งวัดจันทาราม เกาะนกบ้านริ้วหว่า และบ้านหนองจิก
8. พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 14 กลุ่ม ได้แก่ บ้านท่าเสด็จ ทุ่งสระแก้ว สภ.ต. สระแก้ว สวนเกษตรสระแก้ว ทุ่งหนองลุม บ้านมะขามล้ม ทุ่งวัดปากคลองกุ่ม ทุ่งไผ่กองดิน ทุ่งวัดบางแม่หม้าย บ้านบางสะแก บ้านโพธิ์ บ้านท่าตาจร หนองสาหร่าย และบ้านคู-บ้านโคกหม้อ
9. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ ทุ่งบางเสาธง วัดตาลเอน ทุ่งวัดโคก ทุ่งบางจักร ทุ่งมหาราช และทุ่งเจ้าปลุก

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)

10. พื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
11. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วัดไผ่ล้อม หูงวัดบัวหลวง และ หูงลำลูกกา
12. พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะเกร็ด
13. พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ หูงลำปลาทิว และซาฟารีเวิลด์
14. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู
15. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ เกาะลัด

บทสรุป

การสำรวจแหล่งทำรังวางไข่ของนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม(Colony) ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2554 แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่ายังคงติดตามสถานการณ์ใช้หัดนกอย่างใกล้ชิดและยังไม่ละทิ้งความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ของแหล่งทำรังวางไข่ของนกในกลุ่มนี้ ทำให้ทราบว่าจากข้อมูลแหล่งทำรังวางไข่ของนกที่ทำรังวางไข่เป็นกลุ่ม(Colony) ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของแหล่งทำรังวางไข่ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าในจำนวน 72 กลุ่ม(Colony) เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จำนวน 53 กลุ่ม และ จำนวน 19 กลุ่ม เป็นพื้นที่ของรัฐหรือในพื้นที่วัด ซึ่งในส่วนพื้นที่ส่วนบุคคลนั้นพบปัญหาในเรื่องของปริมาณของนกที่เข้าไปทำรังวางไข่มีจำนวนมากจนทำให้เกิดความรำคาญเจ้าของพื้นที่จึงทำการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อมิให้นกสามารถเข้ามาทำรังวางไข่ได้ เช่น โคนต้นไม้เปิดพื้นที่เพื่อทำไร่ นาข้าวแทน เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ของรัฐ หรือในพื้นที่วัดบางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วนกไม่เลือกกลับมาทำรังวางไข่เนื่องจากสภาพพื้นที่เกิดความเสื่อมโทรมเนื่องจากปริมาณนกที่เคยเข้ามาทำรังวางไข่มีมาก จนทำให้ต้นไม้ตาย และไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันในระยะเวลา 1 รอบปี

อย่างไรก็ดีหากพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ของนกในกลุ่มนี้มีการฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติแล้วนกจะกลับมาทำรังวางไข่อีก

แหล่งทำรังวางไข่ที่พบในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง



แหล่งทำรังวางไข่บ้านวังเปิด

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว นกยางเปีย นกแขวก นกยางควาย
นกยางโทนน้อย นกยางโทนใหญ่ นกอ้ายงั่ว และนกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านวังเปิด ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด : UTM 47Q 0626307, 1846706

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าริมแม่น้ำยม บางส่วนเป็นสวนส้มโอ สวนมะม่วง ป่าละเมาะติดทุ่งนาการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านวังเปิด

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านวังเปิด



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านกะพง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว นกยางโทนใหญ่
นกยางโทนน้อย นกยางเปีย นกยางควาย และนกแขวก

ที่ตั้ง : ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด : UTM 47Q 0627103, 1846959

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นเกาะกลางแม่น้ำยม มีต้นไม้ ต้นมะขาม ต้นจามจุรี ต้นคาง ต้นตาล พง อ้อ
ขึ้นกระจัดกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร
เช่น ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านกะพง

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านกะพวง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่วัดพรหมเกษร

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านบางบัว ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด : UTM 47Q 0613157, 1862587

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าไผ่ริมฝั่งแม่น้ำ มีพง อ้อ ขึ้นกระจัดกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และเลี้ยงสัตว์ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วัดพรหมเกษร

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วัดพรหมเกษร



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลอรุณนิคม อำเภอมะนัง จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด : UTM 47Q 638605, 1855064

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ป่า ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ทางด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ป่า ด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่เกษตร เช่นทำนาข้าว กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ




สภาพแหล่งทำรังวางไข่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ชาณ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี่ย นกยางควาย นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย และ
นกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : บ้านหนองเหมือด หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอชาณวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

พิกัด : UTM 47Q 0587470, 1772072

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นร่องสวนน้ำขัง ปลูกต้นสัก มีต้นคาง ต้นยอเถื่อน ต้นชงโค ต้นประดู่ ต้นไผ่ ขึ้น
กระจัดกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ธรรมชาติ
ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ชาณ

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ชาณุ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่คลองขลุ้ง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร

พิกัด : UTM 47Q 0574084, 1794862

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ร่องสวนผลไม้ ติดถนนสายเอเชีย มีแหล่งน้ำกระจายเป็นจุดๆ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว สวนผลไม้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่คลองขลุ้ง

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่คลองขลุง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านหนองหลุม

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลหนองหลุม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

พิกัด : UTM 47Q 0621669, 1833636

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีหย่อมป่าขนาดเล็กกระจาย มีแหล่งน้ำกระจายทั่วไปมีพันธุ์ไม้ เช่น ต้นกระทุ่ม ต้นกระถินยักษ์ ต้นจิกนา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านหนองหลุม

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านหนองหลุม



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วังจิก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านท่าบัวทอง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

พิกัด : UTM 47Q 0636195, 1805968

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าละเมาะ ริมคลองมีต้นทองกวาว ต้นจามจุรี ต้นยูคาลิปตัส ต้นตาล และ
กอไผ่ ขึ้นกระจุกกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น
ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วังจิก

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่รังจิก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่นครไชยबर

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกยางควาย นกยางโทนใหญ่ และนกแขวก

ที่ตั้ง : ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

พิกัด : UTM 47P 0631340, 1765958

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นวนอุทยาน มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นหนาแน่นเต็มพื้นที่ ไม่ได้เน้นคือ ต้นยางนาบางส่วนเป็นไม้ปลูก การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นป่าดิบแล้ง บางบริเวณเป็นพื้นที่แปลงปลูกป่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐแต่บริเวณโดยรอบวนอุทยานเป็นพื้นที่เกษตรกรรม



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่นครไชยबर

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ในศรีชัยบวร



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่เกาะดร.สมิธ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกแซกนกยางเปี่ย นกยางควาย นกช้อนหอยดำเหลือบ
นกช้อนหอยขาว นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย นกกาน้ำปากยาว
และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0629827, 1736773

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นเกาะขนาดเล็กในบึงบอระเพ็ด เกิดจากการขุดลอกบึงแล้วนำดินมาถมจนเป็นเกาะ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบมีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของนกบนเกาะ กรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่เกาะดร.สมิธ

แสงสว่างวาบของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่เกาะดร.สมิธ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่เกาะวัด

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกอ้ายจ้าว นกกาน้ำเล็ก นกกระสาแดง นกแขวก นกยางเปี้ยว
นกช้อนหอยดำเหลือบ นกยางควาย นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย
และนกกาน้ำปากยาว

ที่ตั้ง : ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0629383, 1736640

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นเกาะขนาดใหญ่ในบึงบอระเพ็ด การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบมีการสร้างหอสังเกตการณ์ และนำดินที่ได้จากการขุดลอกบึงมากองถมเรื่อยๆ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่เกาะวัด

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่เกาะวัด



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ประมงเชิงพาณิชย์

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกยางควาย นกยางโทนใหญ่
นกข่อนหอยดำเหลือง นกกาน้ำปากยาว และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0638299, 1738602

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างมีต้นจิกนาขึ้นเป็นกลุ่ม และกระจายอยู่ทั่ว บริเวณโดยรอบเป็น
ทุ่งนา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ (วัว) ธรรมชาติที่ดิน
เป็นที่ดินของรัฐ




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ประมงเชิงพาณิชย์

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ประมงเชิงพาณิชย์



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่เนินระฆัง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก นกยางควาย นกแขวก นกยางโทนใหญ่
นกช้อนหอยขาว และนกช้อนหอยดำเหลือบ

ที่ตั้ง : ตำบลวังมหากกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0639707, 1733983

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าต้นจิกนา แซมด้วยต้นคาง บริเวณขอบชายฝั่ง ไม้พื้นล่าง เป็นไมยราบยักษ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ (วัว) ธรรมชาติที่ดินเป็น
ที่ดินของรัฐ




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่เนินระฆัง

แสงสว่างวาบของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่เนินระฆัง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่แหลมนา

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกยางควาย นกยางโทนใหญ่
นกช้อนหอยดำเหลือง และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : ตำบลวังมหากร อำเภอนาทะโก จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0636677, 1733338

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นทุ่งหญ้าชายบึงกว้าง มีต้นจิกนา ไม้พุ่มหนาม ขึ้นเป็นกลุ่มและกระจายอยู่ทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ลำสัตว์ (หนูนา) กรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่แหลมนา

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่แหลมนา



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วังมหาร

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี่ย นกยางควาย นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย
นกแขวก นกช้อนหอยดำเหลือบ และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : บ้านวังมหาร ตำบลวังมหาร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0642507, 1731725

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมต้นไม้กลางทุ่งนา มีบ่อน้ำขนาบทั้งสองด้าน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
ทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และบ่อเลี้ยงปลา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วังมหาร

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วังมหาร



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านหัวพวง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี้ยว นกยางควาย นกแขวก นกยางโทนน้อย
นกยางโทนใหญ่ นกกาน้ำเล็ก และนกช้อนหอยดำเหลือบ

ที่ตั้ง : บ้านทางคลองยายไหม ตำบลวังมหากร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0641408, 1730922

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นแปลงร่องปล่อยทิ้งร้าง มีต้นสะแกนา ต้นจิกนา ต้นคาง จั่นกระจายทั่วพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และเลี้ยงปศุสัตว์ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านหัวพวง

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านหัวพวง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วัดวังมหากร

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี้ยว นกยางโทนน้อย นกยางควาย นกกาน้ำปากยาว
และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : บ้านวังมหากร ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0642916, 1732948

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ มีต้นไผ่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำ ต้นคาง ต้นยูคาลิปตัส ต้นตาล
ขึ้นทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็น
ที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วัดวังมหากร

แสงสว่างว้างโขงชนกันน้ำดำร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วัดวังมหาร



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านผู้ใหญ่เทือง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว และนกยางเปียว

ที่ตั้ง : ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0641929, 1737469

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ มีต้นยูคาลิปตัสขึ้นทั่วบริเวณพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และบ่อปลา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่ของแหล่งทำรังวางไข่บ้านผู้ใหญ่เทือง

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านผู้ใหญ่เทือง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านผู้ใหญ่เทือง 2

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว และนกยางเปียว

ที่ตั้ง : ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0641785, 1738214

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่บ่อเลี้ยงปลา มีต้นมะขามเทศขึ้นรอบๆ บ่อปลา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และบ่อเลี้ยงปลา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านผู้ใหญ่เทือง 2

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านผู้ใหญ่เทือง 2



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต้าดำดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่เขาพนมเศษ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก นกปากห่าง นกยางเปีย และนกยางควาย

ที่ตั้ง : ตำบลเขาพนมเศษ อำเภอบ้านตาแป้น จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0641610, 1737771

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นทุ่งหญ้ากกสามเหลี่ยมใหญ่ และหญ้าแฉกดอกขาวมีดอกบัวหลวงขึ้นปะปน บริเวณกลางพื้นที่ต้นจิกนาขึ้นเป็นกลุ่มประมาณ 15-20 ต้น การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และไร่ปลูกแตงโม ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่เขาพนมเศษ

แหล่งดำริ่งวางไข่ของนกน้ำที่ดำริ่งเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่เขาพนมเศษ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่พนมเศษ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกแซก นกยางควาย นกยางเปี้ยว และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : ตำบลเขาพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0643109, 1738610

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าละเมาะ มีต้นไผ่ ต้นจิกนา และไม้พุ่มขึ้นกระจัดกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่พนมเศษ

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่พนมเศษ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ท่าตะโก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก และนกยางเปี่ย

ที่ตั้ง : บ้านหนองเนิน ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0653039, 1725046

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ร่องสวน มีต้นมะม่วง ต้นมะพร้าว ต้นกระถินยักษ์ ต้นสะเดา ขึ้นกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำสวนมะม่วง ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ท่าตะโก

แสดงตำราวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ท่าตะโก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บึงน้ำใส 1

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกยางควาย นกแขวก และนกอ้ายจ้าว

ที่ตั้ง : ตำบลบึงน้ำใส อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0625239, 1746308

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นบ่อน้ำ ทำนาข้าว มีต้นคาง ตันนนทรี ต้นทองกวาว ขึ้นกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และทำบ่อปลา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บึงน้ำใส 1

แสดงตำราวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บึงน้ำใส 1



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บึงน้ำใส 2

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกยางควาย นกแขวก และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : ตำบลบึงน้ำใส อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์

พิกัด : UTM 47P 0624105, 1745974

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นบ่อเลี้ยงปลา ทำนาข้าว มีต้นคาง ต้นนนทรี ต้นทองกวาว ขึ้นกระจายทั่วบริเวณ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ทำบ่อเลี้ยงปลา ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บึงน้ำใส 2

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บึงน้ำใส 2



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก นกปากห่าง นกยางเปีย นกยางควาย
นกกาน้ำน้อย และนกแขวก

ที่ตั้ง : ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

พิกัด : UTM 47P 0642916, 1732948

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆ ได้แก่ ต้นตะโก ต้นคาง มีบ่อน้ำเป็นจุดๆ เป็นบ่อเลี้ยงจระเข้
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ของฟาร์มเลี้ยงจระเข้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ฟาร์มจระเข้อุทัยรัตน์



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต้าดำเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่ท่าทราย

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกแซก นกยางเปี้ยว นกยางโทนใหญ่ นกกาน้ำเล็ก และนกยางควาย

ที่ตั้ง : บ้านท่าทราย หมู่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

พิกัด : UTM 47P 0630882, 1678056

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปมีหย่อมต้นไม้เล็กๆ 5 กลุ่ม ส่วนมากเป็นต้นมะขามเทศ ต้นตะโก ต้นสะเดา อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว ธรรมชาติที่ดินบางส่วนทำรังในพื้นที่ส่วนบุคคล และบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ท่าทราย

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทำทราย



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วัดโคกสุก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางควาย นกยางเปีย นกแขวก และนกยางกรอกพันธุ์ขาว

ที่ตั้ง : บ้านโคกสุก ตำบลหนองน้อย อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดชัยนาท

พิกัด : UTM 47P 0608634, 1679637

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปมีกลุ่มต้นไม้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ป่าด้านหลังวัด กลุ่มต้นไม้กลางนาข้าว แวดต้นไม้ตามคันดินตาดินนาข้าว การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ธรรมชาติที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคล และพื้นที่ของวัดโคกสุก




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วัดโคกสุก

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วัดโคกสุก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านลุงบุญลือ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกแขวก นกยางควาย นกยางเปีย
และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : 38/2 หมู่ 8 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พิกัด : UTM 47P 0634878, 1643521

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ทั้งต้นไผ่ ต้นมะพร้าว ต้นตาล ต้นมะขาม ต้นไทร มีแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน ล้อมกลุ่มป่า กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านลุงบุญลือ

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านลุงบุญลือ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วัดห้วยจันทร์

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี้ยว นกแซก นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว นกอ้ายจ้าว
นกกาน้ำใหญ่ นกยางกรอกพันธุ์ชวา และนกกางควาย

ที่ตั้ง : ซอย 8 สายจันทรา ต.บึงโคกตม อ.เมือง จ.พิจิตร

พิกัด : UTM 47P 0701325, 1643662


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ป่าหลังวัดที่ติดกับคลองห้วยจันทร์ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร ปลูกข้าวโพด ปลูกต้นไม้ ธรรมชาติที่ดินเป็นพื้นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วัดห้วยจันทร์

แสงสว่างวาบของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วัดห้วยจันทร์



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งมหาตไทย

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกแซก นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว
นกอ้ายจ้าว นกยางควาย นกยางโทนใหญ่ และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : ตำบลมหาตไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

พิกัด : UTM 47P 0650942, 1611341

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ดินส่วนใหญ่จึงอุดมสมบูรณ์เหมาะในการทำการเกษตร มีต้นมะม่วงและไม้ผลปลูกอยู่ริมคลอง ลักษณะเป็นที่จัดสรร มีบ้านพักปลูกอยู่หลายหลัง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น สวนผลไม้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งมหาตไทย

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งมหาไทย



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบ้านตาล

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกแขวก นกกาน้ำเล็ก
และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : บ้านตาล ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พิกัด : UTM 47P 0646720, 1622909


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีกอไผ่ และป่าละเมาะขึ้นเป็นกลุ่มๆ มีแหล่งน้ำกระจายทั่วพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบ้านตาล

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบ้านตาล



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งโคกพุทรา

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกกาน้ำเล็ก นกยางเปีย และนกแขวก

ที่ตั้ง : บ้านโคกพุทรา ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พิกัด : UTM 47P 0647684, 1625051

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยอมป่าละเมาะ ที่รกร้าง ต้นไม้ส่วนใหญ่ เป็นต้นมะขามเทศ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่กระจายทั่วพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว และสวนผลไม้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งโคกพุทรา

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งโคกพุทรา



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดจันทาราม

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย นกกาน้ำปากยาว นกกาน้ำเล็ก
นกกางไธใหญ่ นกยางควาย นกแขวก และนกกางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : วัดจันทาราม ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

พิกัด : UTM 47P 0648133, 1622353

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนาข้าว และพื้นที่เกษตรกรรม มีคลองชลประทานไหลผ่าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีหย่อมต้นไม้เตี้ยๆ ใกล้เคียงแหล่งน้ำ กระจายทั่วไป การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว สวนผลไม้ ธรรมชาติที่ดินเป็นพื้นที่ของวัดบางส่วน และพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดจันทาราม

แหล่งดำริ่งวางไข่ของนกน้ำที่ดำริ่งเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดจันทร์าราม



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่เกาะนกบ้านริ้วหว้า

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย และนกยางควาย

ที่ตั้ง : บ้านริ้วหว้า ตำบลรามะสัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ

พิกัด : UTM 47P 0639104, 1626055

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีต้นมะพร้าว และต้นไม้ขนาดใหญ่กระจายหลายจุด มีแหล่งน้ำบริเวณร่องสวน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว สวนชา และสวนผลไม้ ภูมิทัศน์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่เกาะนกบ้านริ้วหว้า

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่เกาะนกบ้านร้วหว้า



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านหนองจิก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านหนองจิก หมู่ 1 ตำบลจำลอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

พิกัด : UTM 47P 0643020, 1631524

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมป่าด้านหลังชุมชน อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน และทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว สวนผลไม้ ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านหนองจิก

แหล่งดำริ่งวางไข่ของนกน้ำที่ดำริ่งเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านหนองจิก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านท่าเสด็จ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางควาย นกยางเปี่ย และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : บ้านท่าเสด็จ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0610521, 1604718


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นร่องสวนที่ปล่อยทิ้งร้าง มีต้นมะขามเทศ ต้นมะม่วง ต้นมะพร้าว ต้นกระถินยักษ์ ขึ้นปกคลุมพื้นที่ อยู่ริมลำคลอง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ทำสวนผลไม้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ และบางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านท่าเสด็จ

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านท่าเสด็จ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งสระแก้ว

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปีย และนกยางควาย

ที่ตั้ง : บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0608470, 1603142


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นกลุ่มป่าละเมาะ อยู่ติดถนน และนาข้าว มีร่องน้ำขนาดใหญ่ ด้านหลังติดกับคลอง
ส่งน้ำชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว สวนมะม่วง
กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งสระแก้ว

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งสระแก้ว



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ สก.ต.สระแก้ว

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : วัดบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0608409, 1603009


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นกลุ่มป่ากร้างด้านหลังสถานีตำรวจภูธรสระแก้ว ต้นไม้ค่อนข้างใหญ่ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว สวนผลไม้ พื้นที่ชุมชน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ สก.ต.สระแก้ว

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ สก.ต.สระแก้ว



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่สวนเกษตรสระแก้ว

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลท่าเสาดี อำเภอมะนัง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0611263, 1604140

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นสวนมะม่วง มีต้นมะพร้าวอยู่ตามร่องสวนด้วย อยู่ติดกับถนน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว และสวนผลไม้ และพื้นที่ชุมชน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่สวนเกษตรสระแก้ว

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่สวนเกษตรสระแก้ว



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งหนองลุม

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านหนองลุม ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0598572, 1596457

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยอมต้นไม้หลังบ้าน อยู่กลางชุมชน ติดกับถนน มีต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง ต้น
हुกวาง ขึ้นอยู่ริมบ่อน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ปลูกผลไม้
และเป็นพื้นที่ชุมชน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งหนองลุม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านมะขามล้ม

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านมะขามล้ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาหม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0614802, 1589401

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นสวนที่ปล่อยทิ้งร้าง มีต้นมะพร้าว และไม้ต้นขนาดกลาง จำนวนมาก มีร่องน้ำขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา ภูมิทัศน์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านมะขามล้ม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านมะขามล้ม



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดปากคลองกุ่ม

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : วัดปากคลองกุ่ม ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0627047, 1590236


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมต้นไม้ขนาดใหญ่ มีต้นไผ่ ต้นประดู่ อยู่ภายในบริเวณวัด และบริเวณรอบๆ วัด เป็นหย่อมป่าละเมาะ มีต้นมะพร้าว ต้นจามจุรี มีลำคลองไหลผ่าน และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของวัด และบางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดปากคลองกุ่ม

แสงสร้างวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดปากคลองกุ่ม



เส้นทางรถคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งไผ่กองดิน

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านไผ่กองดิน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาหม้อ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0633160, 1585008

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง มีหย่อมต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ทั่วไป มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดทั้งปี การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งไผ่กองดิน

แสงสว่างจากไข่ของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งไผ่กองดิน



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดบางแม่หม้าย

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : วัดบางแม่หม้าย ตำบลบางแม่หม้าย อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0622718, 1580376

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมป่าริมลำคลอง มีต้นไผ่ ต้นจามจุรี และไม้พุ่มขึ้นกันหนาแน่น อยู่ติดกับชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินรัฐ และบางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดบางแม่หม้าย

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดบางแม่หม้าย



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต้าดำเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านบางสะแก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกแขวก

ที่ตั้ง : วัดบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0620150, 1574299


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมป่าริมลำคลอง อยู่หลังชุมชน มีกลุ่มต้นไม้ ต้นจามจุรี ขึ้นกระจายไปตามลำคลอง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านบางสะแก

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านบางสะแก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่บ้านโพธิ์

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0622173, 1578549

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยดอนไม้ กระจายอยู่ตามทุ่งนา อยู่ติดกับชุมชน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดิน เป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านโพธิ์

แหล่งทำรังวางไข่บ้านท่าตาจร

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0617425, 1630743

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นร่องสวนมะพร้าว มีต้นไผ่ และต้นไม้ขนาดใหญ่กระจายเป็นหย่อมๆ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และไม่ไกลจากคลองส่งน้ำชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว บ่อเลี้ยงกุ้ง สวนผลไม้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านท่าตาจร

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านท่าตาจร



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่หนองสาหร่าย

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง และนกยางควาย

ที่ตั้ง : ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0608173, 1620535


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยอมป่าติดกับบ่อน้ำขนาดใหญ่ มีคลองชลประทานไหลผ่าน มีต้นไม้ใหญ่ ต้นไผ่ ขึ้นอยู่กระจายเป็นกลุ่มๆ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ติดกับชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่หนองสาหร่าย

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่หนองสาหร่าย



เส้นทางคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านคู-บ้านโคกหม้อ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : UTM 47P 0606183, 1617774

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยอมป่าขึ้นริมคลองส่งน้ำชลประทาน ติดกับถนน และนาข้าว การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว กรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านคู-บ้านโคกหม้อ

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านคู-บ้านโคกหม้อ



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบางเสาธง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย นกยางควาย นกแขวก และ
นกยางกรอกพันธุ์ขาว

ที่ตั้ง : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : UTM 47P 0667502, 1600843

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมต้นไม้ ขึ้นกระจายตามทุ่งนา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบางเสาธง

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบางเสาธง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วัดตาลเอน

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว นกยางโทนใหญ่
นกกางเปี้ย นกยางควาย นกแซก และนกยางกรอกพันธุ์ขาว

ที่ตั้ง : วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : UTM 47P 0668190, 1605679

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่อยู่บริเวณวัด และ รอบๆ วัด อยู่ริมลำคลอง และติดถนน มีบ่อน้ำกระจายหลายจุด การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน และทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ปลูกผัก ธรรมชาติที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินของวัด และบางส่วนเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วัดตาลเอน

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วัดตาลเอน



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดโคก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : UTM 47P 0664015, 1593763

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมต้นไม้ ที่ขึ้นอยู่ริมคลอง มีต้นตาล ต้นจามจุรี อยู่ด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนา และแหล่งชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว ทำสวน ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดโคก

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดโคก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบางจักร

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : บ้านบางจักร ตำบลหน้าโคก อำเภอดงหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : UTM 47P 0645748, 1603216


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีกลุ่มต้นไม้ กระจายทั่วไปกลางทุ่งนา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงไก่ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบางจักร

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งบางจักร



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งมหาธาตุ

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลกะทู้ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : UTM 47P 0666801, 1606959


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยดอนไม้ กลางทุ่งนา มีบ่อน้ำกระจายทั่วไป อยู่ติดลำคลอง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทำการเกษตร เช่น ทำนาข้าว ปลูกสวนผัก ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งมหาธาตุ

แสงสว่างวังไข่งงนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งมหาราช



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งเจ้าปลุก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกกาน้ำเล็ก นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย
นกยางควาย นกแซก และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : บ้านเจ้าปลุก ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : UTM 47P 0666094, 1611688

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นขนานไปกับแม่น้ำลพบุรี และกระจายอยู่ตามทุ่งนา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งเจ้าปลุก

แสงสว่างว้างโขงชนกันที่ต้งเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งเจ้าปลุก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกกาน้ำเล็ก นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย นกยางควาย
นกแซง และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พิกัด : UTM 47P 0607518, 1546016


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นกลุ่มต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ติดถนน และพื้นที่ทำการเกษตร มีแหล่งน้ำกระจาย
ทั่วไป การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน ใกล้โรงเรียน และพื้นที่เกษตรกรรม ทำนา
ข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วัดไผ่ล้อม

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกแขวก นกยางเปีย และนกยางโทนใหญ่

ที่ตั้ง : วัดไผ่ล้อม ตำบลบ้านจิว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

พิกัด : UTM 47P 0665010, 1556863


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าบริเวณวัด มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น เช่น ต้นตาล กอไผ่ และไม้ยืนต้นอื่นๆ อยู่ติดกับแม่น้ำ และเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว และทำสวน ธรรมชาติที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินวัด และบางส่วนเป็นที่ดินของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วัดไผ่ล้อม

แหล่งดำริ่งวางไข่ของนกน้ำที่ดำริ่งเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วัดไผ่ล้อม



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดบัวหลวง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกแขวก และนกยางควาย

ที่ตั้ง : ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

พิกัด : UTM 47P 0669921, 1552996


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยอมป่าริมแม่น้ำ เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และมีห้วยอมต้นไม้ขึ้นกระจายตามทุ่งนา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบถูกถางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว และสวน ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดบัวหลวง

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งวัดบัวหลวง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งลำลูกกา

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : คลองสิบสอง ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

พิกัด : UTM 47P 0700773, 1543913

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นห้วยอมต้นไม้ กลางทุ่งนา เป็นพื้นที่รกร้าง ด้านหลังโรงพยาบาลลำลูกกา การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งลำลูกกา

แสงสว่างว้างของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งลำลูกกา



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกเงือกดำดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่เกาะเกร็ด

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง

ที่ตั้ง : ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิกัด : UTM 47P 0660473, 1537586


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นสวนผลไม้ ร่องสวน และกลุ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่เกาะเกร็ด

แสงสว่างจากไฟของนกเงือกดำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่เกาะเกร็ด



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งลำปลาทิว

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางควาย นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ขาว
นกแซก และนกยางโทนใหญ่

ที่ตั้ง : ถนนฉลองกรุง/ถนนสังฆประชา แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พิกัด : UTM 47P 0697465, 1521056

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นสวนร้างที่คล้ายป่าละเมาะ พื้นที่ภายในมีแอ่งน้ำขัง ล้อมรอบด้วยนาข้าวการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ทุ่งลำปลาทิว

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ทุ่งลำปาวทิว



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่ชาฟารีเวิลด์

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกกระทุง นกกابัว และนกกาน้ำเล็ก

ที่ตั้ง : ถนนพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

พิกัด : UTM 47P 0684181, 1533455


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าละเมาะ รกร้าง รอบๆสวนสัตว์เปิด และเป็นกลุ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ใกล้บ่อน้ำขนาดใหญ่ ของสวนสัตว์เปิด การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นแหล่งชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรม ทำนาข้าว อยู่บ้าง ธรรมชาติที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ชาฟารีเวิลด์

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ชาฟารีเวิร์ด



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่สถานตากอากาศบางปู

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว นกยางปีย
นกยางควาย นกยางกรอกพันธุ์ขาว นกแขวก และนกยางโทนใหญ่

ที่ตั้ง : ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

พิกัด : UTM 47P 0678922, 1495276

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นแนวชายฝั่งมีไม้โกงกาง ไม้โปรงและไม้แสม ขึ้นเป็นหย่อมๆ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นชายฝั่งทะเล อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปูใหม่ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่สถานตากอากาศบางปู

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่สถานตากอากาศบางปู



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต้าทำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านยายแข่ง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางควาย นกยางกรอกพันธุ์ชวา และนกยางเปี่ย

ที่ตั้ง : 154 หมู่ 4 ซอย 23 เทศบาล ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0606705, 1459614

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าต้นฝาดเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ พื้นล่างมีน้ำขังเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นที่อยู่อาศัย อยู่ในชุมชน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านยายแข่ง

แสงสร้างวางไข่ของนกน้ำที่สร้างเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านยายเซ่ง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่ตีนนกแอ่นกินรัง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางควาย และ
นกยางโทนใหญ่

ที่ตั้ง : บ้านแหลม หมู่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0607077, 1458909

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าต้นฝาดเนื้อที่ 32 ไร่ บริเวณกลางพื้นที่มีตีนนกแอ่นกินรัง การใช้ประโยชน์
ที่ดินสร้างตึกให้นกแอ่นกินรัง กรมสิทธิที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ตีนนกแอ่นกินรัง

แสงสว่างจากไข่ของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่ตีนกนกแอ่นกินรัง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านแยก

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี้ยว นกยางควาย และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : บ้านแยก หมู่ 4 ตำบลบางขุนไกร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0609635, 1456644

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นหย่อมป่าต้นผาตขนาดเล็กเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านแยก

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านแยก



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต้าดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านสะพานหิน

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี้ยว นกยางควาย และนกยางกรอกพันธุ์ชวา

ที่ตั้ง : บ้านสะพานหิน หมู่ 2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0617306, 1439769

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าต้นฝาด ติดคลองออกทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ เป็นที่รกร้างกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านสะพานหิน

แสงสว่างวาบของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านสะพานหิน



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่แหลมผักเบี้ย

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกกาน้ำเล็ก นกแขวก นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย
นกกางกรอกพันธุ์ขาว นกกาน้ำปากยาว นกยางควาย
และนกยางโทนน้อย

ที่ตั้ง : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ 2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0618838, 1442550

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าชายเลนติดคลองออกสู่ทะเล บริเวณใกล้เคียะมีบ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ของโครงการฯ เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน
กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่แหลมผักเบี้ย

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่หลุมผักเบี้ย



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่วัดพิกุลแก้ว

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี้ยว และนกยางโทนใหญ่

ที่ตั้ง : ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0615372, 1449316

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าช้าหลังวัด มีกลุ่มต้นมะขาม และมะขามเทศ และฝั่งตรงข้ามเป็นป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเป็นป่าช้าวัด ที่ตั้งสถูปใส่กระดูก บ่อเลี้ยงกุ้ง นาเกลือ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินวัด




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่วัดพิกุลแก้ว

แสงสว่างวางใจของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่วัดพิบูลแก้ว



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต่าร้างเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านเจ้าหาด

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปี้ยว นกยางควาย นกกาน้ำเล็ก นกยางกรอกพันธุ์ชวา และ นกยางโทนใหญ่

ที่ตั้ง : บ้านหาดเจ้า หมู่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0614419, 1436682

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นป่าต้นฝาดเป็นแนวยาวเรียบคลองประมาณ 2 ไร่ ติดบ่อกึ่งเก่า การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ทำบ่อเลี้ยงกุ้ง กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล




สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านเจ้าหาด

แสงสว่างวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านเจ้าหาด



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำเต้าดำเป็นกลุ่ม (Colony)

แหล่งทำรังวางไข่บ้านม่วง

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกยางเปีย

ที่ตั้ง : บ้านม่วง หมู่ 8 ตำบลบางเก่า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : UTM 47P 0608133, 1421576

ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นสวนมะพร้าวติดบ่อกึ่ง การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบปลูกมะพร้าว เลี้ยงกุ้ง
กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ดินส่วนบุคคล



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่บ้านม่วง

แหล่งดำรงวางไข่ของนกน้ำที่ดำรงเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่บ้านม่วง



เส้นทางการคมนาคม

แหล่งทำรังวางไข่เกาะลัด

ชนิดนกที่พบทำรัง : นกปากห่าง นกยางเปียว นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำปากยาว นกแขวก
นกยางควาย นกยางกรอกพันธุ์ชวา และนกยางโทนใหญ่

ที่ตั้ง : เกาะลัด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิกัด : UTM 47P 0714395, 1492905


ลักษณะและรายละเอียดของพื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นเกาะกลางลำน้ำที่ถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำที่แยกเป็น 2 ทางผ่านออกสู่ทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ 125 ไร่ ภายในเกาะก็มีทางเดินโดยรอบและหอดูนก 2 จุดซึ่งจะสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพในมุมสูงได้รอบบริเวณเกาะ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเลี้ยงปลากระชัง เป็นท่าเรือ โกดังเก็บของ กรมสรรพากรที่ดินเป็นที่ดินของรัฐ



สภาพพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่เกาะลัด

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ดำรังเป็นกลุ่ม (Colony)



แผนที่ขอบเขตแหล่งทำรังวางไข่เกาะลัด



เส้นทางการคมนาคม

เอกสารอ้างอิง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ม.ป.ป. คู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้หวัดนก ในนกธรรมชาติ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า. 2554. รายงานความก้าวหน้า การสำรวจแหล่งทำรังวางไข่และประเมินจำนวนประชากร ของนกที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony) ในประเทศไทย. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์. รายงานการสำรวจประชากรนกน้ำที่ทำรังเป็นกลุ่มขนาดใหญ่. ส่วน อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี).

จารุจินต์ นภิตะภักดิ์, กานต์ เลชะกุล และ วัชร สงวนสมบัติ. 2550. คู่มือดูนก หมอบุญส่ง เลชะกุล นกเมือง ไทย. คณะบุคคล นายแพทย์บุญส่ง เลชะกุล. กรุงเทพฯ.

ทิจิ สอนสา, กุลธิดา อธิพร, ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ, บรรดาศักดิ์ ป้องศรี และ สุทธิรักษ์ วงษ์แก้ว. 2549. การ ศึกษาเบื้องต้นการทำรังวางไข่ครั้งแรกในประเทศไทยของนกช้อนหอยดำเหลือบ (*Plegadis falcinellus*) ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด. ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างาน วิจัย ประจำปี 2549. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

มงคล ไชยภักดี. 2554. แหล่งทำรังวางไข่ และประชากรของนกปากห่าง (*Anastomus oscitans*) ในที่ราบ ลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช.

สารานุกรมสัตว์. 2013. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. www.zoothailand.org.

อลงกลต แทนอมทอง, กฤษณ์ ปิ่นทอง, กฤษฎา บุณนารมย์ และรัชณี จันทรเพชร. 2548. การประเมินถิ่น อาศัย และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของนกช้อนหอยขาว (*Threskiornis melanocephalus*) ภายหลังจากที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว. วารสารวิจัย มข. 10 (2) : เม.ย.-มิ.ย. 2548.

_____. 2543. หนังสือชุด นกในเมืองไทย เล่ม 3. สารคดี กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2541. นกในบึงบอระเพ็ด. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ.

Watchara Sanguansombat. 2005. Thailand Red Data : Birds. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Thailand.

_____. 2012. Recently recategorised species. <http://www.birdlife.org>.

ดัชนีแหล่งทำรังวางไข่

แหล่งทำรังวางไข่ของนกกระทง	167
แหล่งทำรังวางไข่ของนกกระสาแดง	65
แหล่งทำรังวางไข่ของนกกาน้ำเล็ก	45, 47, 53, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 101, 105, 107, 109, 145, 153, 155, 167, 169, 173, 179, 183, 187.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกกาน้ำปากยาว	45, 47, 63, 65, 67, 77, 79, 81, 101, 103, 109, 145, 169, 179, 187.
แหล่งทำรังวางไข่กาบบัว	93, 167.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกแขวก	45, 47, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 133, 143, 145, 153, 155, 157, 159, 165, 169, 179, 187.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกซ้อนหอยขาว	63, 69.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกซ้อนหอยดำเหลือบ	63, 65, 67, 71, 73, 75,
แหล่งทำรังวางไข่ของนกปากห่าง	45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 83, 85, 89, 91, 93, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 187.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกยางเปี่ย	45, 47, 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 143, 145, 153, 155, 157, 165, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกยางโทนใหญ่	45, 47, 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 95, 101, 103, 109, 143, 145, 153, 155, 157, 165, 169, 173, 179, 181, 183, 187.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกยางโทนน้อย	45, 47, 53, 63, 65, 73, 75, 77, 93, 179.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกยางกรอกพันธุ์ขาว	97, 99, 101, 103, 105, 109, 115, 143, 145, 153, 155, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกยางควาย	45, 47, 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 115, 117, 139, 143, 145, 153, 155, 159, 165, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187.
แหล่งทำรังวางไข่ของนกอ้ายจั่ว	45, 65, 89, 101, 103.

แหล่งทำรังวางไข่ของนกน้ำที่ทำรังเป็นกลุ่ม (Colony) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ผู้จัดทำ : ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ, อมรรัตน์ ว่องไว, บรรดาศักดิ์ ป้องศรี, ชิตู สอนสา, กุลธิดา อธิธิพร.

ที่ปรึกษา : มโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 ดร. อธิปไตย ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 ณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
 บุษบง กาญจนสาขา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า

ออกแบบรูปเล่ม : อมรรัตน์ ว่องไว

ภาพถ่าย : ชิตู สอนสา, มงคล ไชยภักดี, สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวน : 1,000 เล่ม

พิมพ์ที่ : ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า

อาคารไพโรจน์สุวรรณกร (ตึก 100 ปี)

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-9407058, 02-9406934, 02-5796666 ต่อ 1670, 1671, 1677

โทรสาร 02-579987

<http://www.wildlife1@dnpp.go.th>



กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2940 7058, 0 2941 6934 ต่อ 1670, 1671, 1677
<http://www.wildlife1@dnpp.go.th>

