

งานศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่าเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่


โครงการวิจัยการศึกษาเส้นทางการอพยพของนกโดยการติดเครื่องหมายติดตามตัวสัตว์



สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานการพบนกติดเครื่องหมายธงสี (Leg flag) และห่วงขา (Metal ring) จากประเทศไทยอพยพไปพบยังต่างประเทศและนกที่ทำเครื่องหมายธงสีจากต่างประเทศอพยพมายังประเทศไทย จากข้อมูลรายงานธงสีและห่วงขา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชนิด	จำนวนรายงานนกติดธงสี และห่วงขา จากประเทศ ไทย อพยพไปยัง ต่างประเทศ	จำนวนรายงานนกติดธงสี และห่วงขา จาก ต่างประเทศ อพยพมายัง ประเทศไทย	รวม
1	นกชายเลนปากแอม	2	5	7
2	นกชายเลนปากช้อน	-	4	4
3	นกคอสั้นตีนไว	3	-	3
4	นกพลิกหิน	7	-	7
5	นกสตันท์คอแดง	14	30	44
6	นกน้อทเล็ก	64	-	64
7	นกน้อทใหญ่	48	20	68
8	นกชายเลนบึง	1	4	5
9	นกหัวโตทรายเล็ก	3	17	20
10	นกหัวโตทรายใหญ่	-	3	3
11	นกหัวโตสีเทา	1	-	1
12	นกทะเลขาเขียวลายจุด	1	-	1
13	นกชายเลนปากโค้ง	47	9	56
14	นกชายเลนปากกว้าง	46	9	55
15	นกทะเลขาแดงธรรมดา	10	7	17
16	นกตีนเทียน	-	1	1
17	นกปากแอมหางดำ	-	2	2
18	นกปากแอมหางลาย	130	4	134
19	นกซ่อมทะเลอกแดง	-	4	4
รวม		377	119	496




นกชายเลนปากแฉ่น (Terek Sandpiper) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจาก Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางอพยพมายังอ่าวไทยตอนใน บ้านปากทะเล จ.เพชรบุรี จำนวน 1 รายงาน และเดินทางอพยพมายังปากน้ำประแส จ.ระยอง เป็นระยะทาง 2,937 กิโลเมตร จำนวน 4 รายงาน มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเกาะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายงาน และทางตอนเหนือของ เมือง Dongjin ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะทาง 4,218 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่าง เดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกชายเลนปากแฉ่น Terek Sandpiper



Chalermchai Ouchan@Prasae




นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากตอนเหนือของเมือง Chukotka สหพันธรัฐรัสเซีย อพยพมายังอ่าวไทยตอนใน บริเวณบ้านปากทะเล จ.เพชรบุรี ประเทศไทย เป็นระยะทาง 8,464 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน และมีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากตอนใต้ของเมือง Chukotka สหพันธรัฐรัสเซีย อพยพมายังอ่าวไทยตอนใน บริเวณโคกขาม จ.สมุทรสาคร และบ้านปากทะเล จ.เพชรบุรี ประเทศไทย เป็นระยะทาง 7,990 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน โดยพบว่านกที่พบบริเวณโคกขาม จ.สมุทรสาคร มีหมายเลข 05 บนธงสี ส่วนนกที่บริเวณบ้านปากทะเล จ.เพชรบุรี มีหมายเลข 02 บนธงสี (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกชายเลนปากช้อน Spoon-billed Sandpiper




SmithSutibut@KhokKham



นกกอสันตินไว (Sanderling) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,372 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน และ เมือง Zuidong, Tanshang มณฑล Hebei สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,441 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสี ระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)




นกคอสั้นตีนไว Sanderling



นกพลิกหิน (Ruddy Turnstone) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเกาะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยัง อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 4,005 กิโลเมตร จำนวน 7 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)



นกพลิกหิน Ruddy Turnstone




นกสตันท์คอแดง (Red-necked Stint) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายรังสีจากต่างประเทศพบ บริเวณอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี และจ.ชลบุรี ประเทศไทย ประกอบด้วย จากตอนเหนือของเมือง Chukotka สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะทาง 8,408 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน อ่าว Odoptu ตอนเหนือของ เกาะ Sakhalin สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะทาง 5,776 กิโลเมตร จำนวน 6 รายงาน เมือง Hokkaido ประเทศ ญี่ปุ่น เป็นระยะทาง 5,418 กิโลเมตร จำนวน 6 รายงาน อ่าว Tokyo ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะทาง 4,591 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เมือง Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,027 กิโลเมตร จำนวน 10 รายงาน เมือง Taipei ไต้หวัน เป็นระยะทาง 2,412 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน

เมือง Mai Po, Hong Kong (China) เป็นระยะทาง 1,757 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน เมือง Broome, 180 miles beach, ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย (NW Australia) เป็นระยะทาง 4,309 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน และมีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายรังสีจากเมือง Victoria ประเทศออสเตรเลีย อพยพมายัง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย จ.บุรีรัมย์ ประเทศไทย เป็นระยะทาง 7,225 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน

รายงานการพบนกทำเครื่องหมายรังสีจากอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี อพยพไปพบยังต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Odoptu ตอนเหนือของเกาะ Sakhalin สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นระยะทาง 5,776 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน เมือง Yalu Jiang มณฑล Liaoning สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,774 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,372 กิโลเมตร จำนวน 5 รายงาน เมือง Wulpo ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะทาง 3,659 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เมือง Mai Po, Hong Kong (China) เป็นระยะทาง 2,256 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน และมีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายรังสีจากเกาะลิบง จ.ตรัง อพยพไปยัง เมือง Zuidong, Tanshang มณฑล Hebei สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 4,018 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานรังสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547-ธันวาคม 2556)




นกสตีนท์คอแดง Red-necked Stint



นกน๊อตเล็ก (Red Knot) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยัง อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 62 รายงาน มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเกาะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยัง ต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายงาน และเมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)



นกนือทเล็ก Red Knot




นกน็อทใหญ่ (Great Knot) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากต่างประเทศพบบริเวณอ่าวไทย ตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี ประเทศไทย ประกอบด้วย เมือง Yalu Jiang มณฑล Liaoning สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,774 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน เมือง Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 2,971 กิโลเมตร จำนวน 9 รายงาน เมือง Broome, 180 miles beach, ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย (NW Australia) เป็นระยะทาง 4,299 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน นอกจากนี้ มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเมือง Broome, 180 miles beach, ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย (NW Australia) เดินทางมายังปากน้ำประแส จ.ระยอง เป็นระยะทาง 4,168 กิโลเมตร จำนวน 1

รายงาน มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเมือง Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางอพยพมายังประเทศไทย ประกอบด้วย ปากน้ำประแส จ.ระยอง เป็นระยะทาง 2,937 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน ลิบง จ.ตรัง เป็นระยะทาง 3,561 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน และปากน้ำกระบี่ จ.กระบี่ จำนวน 1 รายงาน

รายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี อพยพไปพบยังต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,372 กิโลเมตร จำนวน 4 รายงาน เมือง Yalu Jiang มณฑล Liaoning สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,774 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เมือง Broome, 180 miles beach, ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย (NW Australia) เป็นระยะทาง 4,299 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน มีรายงานการพบนกติดเครื่องหมายธงสีจากเกาะลิบง จ.ตรัง ไปพบยังต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 รายงาน เมือง Yalu Jiang มณฑล Liaoning สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 4,734 กิโลเมตร จำนวน 10 รายงาน เมือง Zuidong, Tanshang มณฑล Hebei สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 4,071 กิโลเมตร จำนวน 10 รายงาน เมือง Broome, 180 miles beach, ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย (NW Australia) เป็นระยะทาง 3,806 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน เมือง Sumatera Utera ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะทาง 402 กิโลเมตร จำนวน 6 รายงาน เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทาง 503 กิโลเมตร จำนวน 7 รายงาน เมือง Pinang ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 รายงาน นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายจากเกาะลิบง จ.ตรัง เดินทางอพยพไปยัง จ. เพชรบุรี อ่าวไทยตอนใน เป็นระยะทาง 649 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)



นกนือทใหญ่ Great Knot




นกชายเลนบึง (Marsh Sandpiper) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากต่างประเทศพบบริเวณอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย มาจากอ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,254 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากต่างประเทศพบบริเวณพื้นที่นาข้าว จ.มหาสารคาม ประเทศไทย ประกอบด้วย จากเมือง Cangzhou, Tanshang มณฑล Hebei สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 2,802 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน และเมือง Java ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะทาง 2,848 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน มีรายงานการพบนกติดเครื่องหมายธงสีจากอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยังอ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นระยะทาง 3,338 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกชายเลนบึง Marsh Sandpiper






นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand Plover) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากต่างประเทศพบบริเวณอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และบางปู จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย ประกอบด้วย จากเมือง Broome, 180 miles beach, ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย (NW Australia) เป็นระยะทาง 4,323 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน เมือง Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะทาง 1,724 กิโลเมตร จำนวน 6 รายงาน จากเมือง Sungei Buloh ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะทาง 1,706 กิโลเมตร จำนวน 9 รายงาน นอกจากนี้ยังจับข้านกที่ไล่ห้วงมาจากเมือง Perak ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 ตัว รายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี อพยพไปยังเมือง Sungei Buloh ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะทาง 1,680

กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน รายงานการพบซากนกทำเครื่องหมายธงสีและห่วงขาจากเกาะลิบง จ.ตรัง ติดตามถ่ายภาพ
ดักปลาของชาวประมง บริเวณอ่าวมะตะมะ ประเทศพม่า จำนวน 2 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือน
ตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)



นกหัวโตทรายเล็ก Lesser Sand Plover




นกหัวโตทรายใหญ่ (Greater Sand Plover) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจาก Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายงาน เดินทางอพยพลงมาทางใต้เป็นระยะทาง 3,022 กิโลเมตร มายังอ่าวไทยตอนใน บริเวณพื้นที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ประเทศไทย และพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเมือง Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 รายงาน อพยพขึ้นเหนือเป็นระยะทาง 1,681 กิโลเมตร มายังอ่าวไทยตอนใน บริเวณพื้นที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกหัวโตทรายใหญ่ Greater Sand Plover




Greater Sand Plover (Smith Sutibut)



นกหัวโตสีเทา (Grey Plover) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจาก จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย
เดินทางอพยพขึ้นเหนือเป็นระยะทาง 3,727 กิโลเมตร ไปยัง Yalu Jiang มณฑล Liaoning สาธารณรัฐประชาชน
จีน จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกหัวโตสีเทา Grey Plover






นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann's Greenshank) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจาก เกาะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย เดินทางอพยพขึ้นเหนือเป็นระยะทาง 3,023 กิโลเมตร ไปยัง Rudong มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)



นกทะเลขาเขียวลายจุด Nordmann's Greenshank




นกชายเลนปากโค้ง (Curlew Sandpiper) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากต่างประเทศพบบริเวณอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี ประเทศไทย ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,372 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน เมือง Cangzhou, Tanshang มณฑล Hebei สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,222 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เมือง Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 2,971 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เมือง Broome, 180 miles beach, ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย (NW Australia) เป็นระยะทาง 4,323 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน และ ตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SE South Australia) เป็นระยะทาง 7,062 กิโลเมตร

จำนวน 1 รายงาน มีรายงานการพบนกติดเครื่องหมายธงสีจากอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,372 กิโลเมตร จำนวน 45 รายงาน เมือง Zuidong, Tanshang มณฑล Hebei สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 3,441 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน และเมือง Mai Po, Hong Kong (China) เป็นระยะทาง 2,256 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)



นกชายเลนปากโค้ง Curlew Sandpiper




นกชายเลนปากกว้าง (Broad-billed Sandpiper) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเมือง Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 รายงาน เดินทางอพยพลงมาทางใต้เป็นระยะทาง 3,027 กิโลเมตร มายังอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร และจ.เพชรบุรี ประเทศไทย และนกที่ทำเครื่องหมายธงสีจากอ่าวไทยตอนใน ประเทศไทย เดินทางอพยพขึ้นเหนือเป็นระยะทาง 3,372 กิโลเมตร ไปยังอ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 46 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

Smith Sutibut



นกชายเลนปากกว้าง Broad-billed Sandpiper




นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common Redshank) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายรังสีจากต่างประเทศ อพยพมายังอ่าวไทยตอนใน ประเทศไทย ประกอบด้วย จากเมือง Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะทาง 1,723 กิโลเมตร จำนวน 5 รายงาน จากเมือง Sungei Buloh ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะทาง 1,704 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน นอกจากนี้ มีรายงานการจับนกที่มีห่วงโลหะมาจาก เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย จับได้ที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายรังสีจากอ่าวไทยตอนใน เดินทางอพยพไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วย เมือง Jambi, Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะทาง 1,704 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เมือง Sungei Buloh ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะทาง 1,680 กิโลเมตร จำนวน 2

รายงาน เมือง Johor ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทาง 1,287 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน เมือง Selangor ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทาง 1,287 กิโลเมตร จำนวน 3 รายงาน เมือง Pinang ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทาง 890 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกทะเลขาแดงธรรมดา Common Redshank



Common Redshank (Smith Sutibut)




นกตีนเทียน (Black-winged Stilt) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจาก อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายงาน เดินทางอพยพลงมาทางใต้เป็นระยะทาง 3,258 กิโลเมตรมายังอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

© Ken Billington



นกตีนเทียน Black-winged stilt




นกกปากแอนหางดำ (Black-tailed Godwit) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเมือง Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายงาน เดินทางอพยพลงมาทางใต้เป็นระยะทาง 3,022 กิโลเมตร มายังอ่าวไทยตอนใน บริเวณพื้นที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ประเทศไทย และพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเมือง Sumatra ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 รายงาน อพยพขึ้นเหนือเป็นระยะทาง 1,681 กิโลเมตร มายังอ่าวไทยตอนใน บริเวณพื้นที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกปากแอนหางดำ Black-tailed Godwit



Photo © Robin Newlin




นกอปากแฉ่นหางลาย (Bar-tailed Godwit) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเมือง Chongming มณฑล Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 รายงาน เดินทางอพยพลงมายังอ่าวไทยตอนใน จ.สมุทรสาคร เป็นระยะทาง 2,977 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เดินทางอพยพมายังเกาะลิบง จ.ตรัง เป็นระยะทาง 3,560 กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากเกาะลิบง จ.ตรัง ประเทศไทย เดินทางอพยพไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 4,005 กิโลเมตร จำนวน 83 รายงาน เมือง Zuidong, Tanshang มณฑล Hebei สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 4,071 กิโลเมตร จำนวน 12 รายงาน อพยพไปยัง Yalu Jiang มณฑล Liaoning

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะทาง 4,372 กิโลเมตร จำนวน 31 รายงาน เมือง Inchoen ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะทาง 4,331กิโลเมตร จำนวน 2 รายงาน เมือง Sumatera Utera ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะทาง 402 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน และ เมือง Kuala, Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทาง 463 กิโลเมตร จำนวน 1 รายงาน (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกปากแฉ่นหางลาย Bar-tailed Godwit



Photo © Andreas Kim



นกขอมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher) มีรายงานการพบนกทำเครื่องหมายธงสีจากอ่าว Bohai มณฑล Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 รายงาน เดินทางอพยพลงมาถึงได้เป็นระยะทาง 3,258 กิโลเมตร มายังอ่าวไทยตอนใน บริเวณพื้นที่อ่าวมหาชัย ศูนย์ศึกษาป้าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย (ข้อมูลรายงานธงสีระหว่างเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2556)

นกช่อมทะเลอกแดง Asian Dowitcher



Smith Sutibut