

ความหลากหลายและความชุกชุมของนกในป่าบาลา

ศิริพร ทองอารีย์

รศ.นาถิณี สาเร

บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลาโดยเดินสำรวจและจำแนกชนิดนกจากการพบเห็นโดยตรงและเสียงร้อง ตามเส้นทางสำรวจ 11 เส้น ระยะทาง 64 กิโลเมตร เดือนเว้นเดือนต่อเนื่องกัน 6 ครั้ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2543 ถึงกันยายน 2544 พบนก 286 ชนิด จำแนกเป็น กลุ่มที่พบบ่อยมาก หรือมีความชุกชุมมาก (A) 23 ชนิด กลุ่มที่พบค่อนข้างบ่อย หรือมีความชุกชุมค่อนข้างมาก (C) 90 ชนิด กลุ่มที่พบบานกลาง หรือมีความชุกชุมปานกลาง (MC) 119 ชนิด และกลุ่มที่พบน้อย หรือมีความชุกชุมน้อย (UC) 54 ชนิด จำแนกกลุ่มตามสถานภาพของนกที่ปรากฏในแต่ละฤดูกาล และสถานภาพด้านการอนุรักษ์ เป็นนกประจำถิ่น (R) 257 ชนิด นกย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว (W) 21 ชนิด นกย้ายถิ่นผ่าน (P) 5 ชนิด นกย้ายถิ่นช่วงฤดูผสมพันธุ์ (B) 3 ชนิด นกชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) 3 ชนิด นกชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (EN) 34 ชนิด นกชนิดที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ (VU) 22 ชนิด นกชนิดที่ใกล้ถูกคุกคาม (NT) 34 ชนิด ระดับความชุกชุมของนกมีความสัมพันธ์กับขนาดตัวนก พฤติกรรมการหาอาหาร และเสียงร้อง

คำนำ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาอยู่ในเขตการกระจายพันธุ์สัตว์อนุภูมิภาคซุนดา (Sundaic Sub-region) เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะสังคมพืชเป็นป่าดงดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest) มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น ไม้ยืนต้นมักมีเรือนยอดชิดกัน และส่วนใหญ่เป็นไม้ในตระกูลยาง (Dipterocarpaceae) นอกจากนี้ยังมีพืชพวกหมากและหวายในวงศ์ปาล์ม (Palmae) ขึ้นอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้พื้นล่างหรือพืชปกคลุมดินส่วนใหญ่ เป็นพวกขิงข่า (Zingiberaceae) และบอน (Araceae) ผืนป่าแห่งนี้ถูกแยกเป็น 2 ส่วน คือ

ป่าฮาลา มีเนื้อที่ประมาณ 165,000 ไร่ (264 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอำเภอนายูง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง พบที่ราบเฉพาะบริเวณลำคลอง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 100-1,490 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำปัตตานี

ป่าบาลามีเนื้อที่ประมาณ 105,725 ไร่ (169 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ป่าในอำเภอยะรัง และอำเภอสุนทรบุรี จังหวัดนราธิวาส สภาพป่าเป็นป่าดงดิบ มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 100-953 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำโก-ลก และแม่น้ำสายบุรี ด้วยระบบนิเวศป่าที่ราบต่ำจึงทำให้ป่าบาลาเป็นแหล่งอาศัยของนกที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่ง Round (1997) ได้รายงานการสำรวจนกในป่าแห่งนี้ว่ามีไม่ต่ำกว่า 131 ชนิด และ สุธี ศุภรัฐวิกร (2543) ได้รายงานการพบนกใหม่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาว่ามีจำนวนถึง 8 ชนิด

เนื่องจากนกเป็นสัตว์ป่าที่มีสีสันสวยงาม เสียงไพเราะ มีคุณค่าทางจิตใจและสันถนาการเป็นตัวเชื่อมให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เช่น ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ช่วยกระจายเมล็ดไม้ ทำจัดแมลงที่เป็นศัตรูป่าไม้ ทั้งยังเป็นสิ่งบ่งชี้คุณภาพของพื้นที่ป่าแห่งนั้น การศึกษาหาความหลากหลายและความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์ป่าจำพวกนกในผืนป่าบาลา จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่านุรักษ์ แห่งนี้ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมของสัตว์ และการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของนกในป่าบาลาใช้เวลา ดำเนินงานประมาณ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 ถึงเดือนกันยายน 2544 โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. จัดทำเส้นทางสำรวจ โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:50,000 ประกอบการวางแผนสำรวจครอบคลุมทั่วพื้นที่ จำนวน 11 เส้น ระยะทาง 64 กิโลเมตร โดยติดป้ายสังกะสีแสดงระยะทางทุกระยะ 100 เมตร บริเวณลำต้นของต้นไม้มีอยู่ในเส้นทางสำรวจ

2. สำรวจจำแนกชนิดนกจากเห็นตัวด้วยกล้องส่องทางไกลสองตา กำลังขยาย 8 X 50 และเสียงร้องที่ปรากฏในเส้นทางสำรวจ โดยดำเนินการสำรวจเดือนเว้นเดือน เริ่มสำรวจเวลา 7.00น. และสิ้นสุดเวลา 19.00 น. ทำติดต่อกัน 6 ครั้ง ใช้หนังสือ A Guide to the Birds of Thailand เป็นคู่มือในการจำแนกชนิดนก

3. วิเคราะห์ข้อมูลหาความชุกชุมของนก โดยนำข้อมูลชนิดและความถี่ในการพบมาคำนวณหาค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill (1950) ดังนี้

$$\% \text{ ความชุกชุม (A)} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พบนก} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่ออกสำรวจ}}$$

$$\text{ความชุกชุมสัมพัทธ์ (RA)} = \frac{\text{ความชุกชุมของชนิดนก} \times 100}{\text{ผลรวมค่าความชุกชุมของนกทุกชนิดที่พบ}}$$

กำหนดความชุกชุมของนกที่ได้จากการสำรวจดังนี้

1-9	พบน้อย (R)
10-30	พบน้อย (UC)
31-64	พบนานกลาง หรือมีความชุกชุมปานกลาง (MC)
65-85.1	พบค่อนข้างบ่อยหรือมีความชุกชุมมาก (C)
86-100	พบบ่อย (A)

4. ประเมินสถานภาพของนกที่ปรากฏในแต่ฤดูกาล และสถานภาพด้านการอนุรักษ์โดยอ้างอิงการประเมินการคุกคามในระดับโลกจาก Collar et al. (1994) โดยใช้สัญลักษณ์อักษรแสดงดังนี้

- R = นกประจำถิ่น
W = นกย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว
P = นกย้ายถิ่นผ่าน
B = นกย้ายถิ่นช่วงฤดูผสมพันธุ์
CR = ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง เป็น ชนิดที่มีความเสี่ยงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในอนาคตอันใกล้
EN = ใกล้จะสูญพันธุ์
VU = มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์
NT = ใกล้ถูกคุกคาม พบได้ค่อนข้างน้อย หรือมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด หรือหายไปจากบางถิ่นที่เคยมีในประเทศไทย

ผลและวิจารณ์ผล

ความหลากหลายชนิด

ความหลากหลายชนิดของนกในป่าบาลา ในระหว่างเดือนตุลาคม 2543-กันยายน 2544 พบนก 286 ชนิด หรือร้อยละ 29.7 ของชนิดนกที่รายงานการพบในประเทศไทยครั้งล่าสุด ในปี 2543 คือ 962 ชนิด ชนิดและความชุกชุมปรากฏตามตารางที่ 1 โดย แบ่งกลุ่มตามความชุกชุมหรือโอกาสที่พบ ได้ดังนี้

1. พบบ่อยมาก หรือมีความชุกชุมมาก (A) 23 ชนิด
2. พบค่อนข้างบ่อย หรือมีความชุกชุมค่อนข้างมาก (C) 90 ชนิด
3. พบปานกลาง หรือมีความชุกชุมปานกลาง (MC) 119 ชนิด
4. พบน้อย หรือมีความชุกชุม น้อย (UC) 54 ชนิด

จำแนกกลุ่มตามสถานภาพของนกที่ปรากฏในแต่ฤดูกาล และสถานภาพด้านการอนุรักษ์ ดังนี้

1. นกประจำถิ่น (R) 257 ชนิด กลุ่มที่พบมีความชุกชุมมาก พบเห็นได้บ่อย และกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เช่น เหยี่ยวรุ้ง นกเงือกหัวแรด นกเป็ดน้ำจืด นกเขาเขียว นกแอ่นฟ้าเคราขาว นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว และนกปรอดสีน้ำตาลตาแดง นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกเขียวก้านตอง นกกระเต็นอกขาว นกแว่นตาขาวสีเหลืองปากสีใต้ และนกกระเจี๊ยบธรรมดา เป็นต้น กลุ่มที่มีความชุกน้อย เช่น นกขุนแผนตะโพกแดง นกทืดท้อมลาย นกปรอดอกลายเกล็ด นกขุนทอง และนกระวังไพร หลังแดง เป็นต้น

2. นกย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว (W) 21 ชนิด กลุ่มที่พบได้ค่อนข้างบ่อย และพบได้ทั่วพื้นที่ ได้แก่ นกอุ้มบาตร นกเต่าลมหลังเทา เป็นต้น และกลุ่มที่มีค่าความชุกชุมปานกลาง เช่น นกเขนน้อย ไชบีเรีย ซึ่งพบทั้งที่เป็นนกโตเต็มวัย(adult) และนกอพยพเป็นปีแรก (first winter plumage) นกกระเบื้องคอขาว เป็นต้น

3. นกย้ายถิ่นผ่าน (P) 5 ชนิด ได้แก่ นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง นกจับแมลงตะโพกเหลือง นกอีเสือลายเสือ ซึ่งมีค่าความชุกชุมปานกลาง นกแซวสวรรค์หางดำ และเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น มีค่าความชุกชุมน้อย

4. นกย้ายถิ่นช่วงฤดูผสมพันธุ์ (B) 3 ชนิด ได้แก่ นกแก้วแล้วอกเขียว ซึ่งพบลูกนก ในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม นกเดินดงหัวสีส้ม และนกคัคคูลาย

5. นกชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) 4 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทาซึ่งมีความชุกชุมปานกลาง นกเงือกปากย่น นกเป้ล่าใหญ่ และนกปรอดแม่ทะ มีค่าความชุกชุมน้อย และทั้ง 4 ชนิด พบเฉพาะในพื้นที่ป่าต่ำที่ความสูงจากน้ำทะเลต่ำกว่า 400 เมตร

6. นกชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (EN) 34 ชนิด นกเงือกหัวแรด และนกหว่า เป็นชนิดที่พบบ่อยมีค่าความชุกชุมมาก พบกระจายทั่วพื้นที่ นกเงือกหัวแรดพบอยู่รวมเป็นฝูงในช่วงปลายเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม จำนวนมากที่สุดที่พบ คือ 44 ตัว มีช่วงฤดูผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม สำหรับนกหว่า สามารถได้ยินเสียงร้องตลอดทั้งวันและพบทั่วพื้นที่ ในเส้นทางสำรวจ 10 เส้น พบลานที่ใช้ในการแสดงพฤติกรรมเกี่ยวพาราสี (breeding ground) 11 แห่ง และพบรัง จำนวน 3 รัง ห่างจากอยู่บนพื้นดินระหว่างพุ่มพอนของต้นไม้ โดยมีกิ่งไม้เล็กเป็นรั้วล้อมพุ่มพอน รังนกหว่าจะอยู่ห่างจากลานประมาณ 150 – 200 เมตร กลุ่มที่พบค่อนข้างบ่อยมีความชุกชุมค่อนข้างมาก ได้แก่ เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา นกเค้าแดง นกชนหิน และนกโพระดกหลากสี เป็นต้น กลุ่มที่มีความชุกชุมน้อย ได้แก่ นกเป้ล่าหน้าแดง นกเค้าหน้าผากขาว นกปากกบปากสีใต้ นกขุนแผนท้ายทอยแดง และนกเงือกดำ กลุ่มที่มีความชุกชุมปานกลาง ได้แก่ เหยี่ยวคางคาว นกกระปูดนิ้วสั้น นกแก้วแล้วยักษ์ นกแก้วแล้วแดงมลายู นกอีแพรดคอลาย นกจับแมลงอกสีส้ม นกจับแมลงอกเทา และนกทางเขนหางแดง เป็นต้น กลุ่มที่มีความชุกชุมน้อย ได้แก่ นกเป้ล่าหน้าแดง นกเค้าหน้าผากขาว นกปากกบปากสีใต้ นกขุนแผนท้ายทอยแดง นกเงือกกรามข้างปากเรียบ และนกเงือกดำ เป็นต้น นกในกลุ่มที่มีความชุกชุมน้อย ชุกชุมปานกลาง และชุกชุมน้อยที่พบล้วนมีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าต่ำซึ่งมีประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าบาลา

7. นกชนิดที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ (VU) 22 ชนิด เป็นกลุ่มที่มีความชุกชุมน้อย ได้แก่ นกขุนแผนหัวดำ นกเงือกหัวทอง นกพญาไฟเล็กคอดำ นกกินแมลงหูขาว และนกกินปลีแดง เป็นต้น กลุ่มที่มีความชุกชุมปานกลาง ได้แก่ นกปากกบพันธุ์ขาว (พบรังในช่วงเดือน เมษายน - กรกฎาคม) นกพญาปากกว้างทองแดง (พบรังห้อยแขวนตามพุ่มไม้ริมคลองในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม) นกกาน้อย แถบปีกขาว นกกินแมลงคอดำ นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (พบรังห้อยแขวนอยู่บนใบของต้นหมากพอน อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 8 เมตร) และนกกาฝากอกแดง เป็นต้น กลุ่มนกที่พบค่อนข้างบ่อย ได้แก่ นกปรอดสีคอใต้คอเหลือง นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ นกกินแมลงหลังฟู นกกินแมลงตะโพกแดง นกคอสามสี และนกปลีกล้วยปากยาว (พบสร้างรังอยู่ตามหลังใบของต้นปุดช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม)

8. นกชนิดที่ใกล้ถูกคุกคาม (NT) 34 ชนิด เป็นกลุ่มที่มีความชุกชุมน้อย ได้แก่ นกอินทรีดำ นกเค้าป่าหลังจุด นกแอ่นกินรัง นกแซวสวรรค์หางดำ กลุ่มที่มีความชุกชุม ปาน กลาง ได้แก่ นกกก นกคุ้มสี นกหัวขวานหลังสีส้ม นกขมิ้นหัวดำเล็ก เป็นต้น ส่วนนกที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ได้แก่ นกเงือกปากย่น

การหาค่าความชุกชุมของนก โดยสำรวจนกที่พบเห็นตัว หรือได้ยินเสียงตามเส้นทาง ครั้งนี้พบว่า โอกาสที่จะพบนกมีส่วนสัมพันธ์กับขนาดตัว แหล่งอาศัย แหล่งหากิน และพฤติกรรมของนก

- นกที่มีขนาดใหญ่และหากินเหนือเรือนยอดไม้ เช่น นกเงือกหัวแรด เหยี่ยวรุ้ง สามารถพบเห็นได้ง่ายจึงมีความชุกชุมมาก ขณะที่นกที่มีขนาดเล็กกรองลงมาและหากินในพุ่มไม้ เช่น นกขุนแผน นกบั้งรอก หรือนกที่มีขนาดเล็กและหากินตามพื้นดินหรือไม้พื้นล่างซึ่งทึบและหนาแน่น เช่น กลุ่มนกกินแมลง นกจับแมลง นกกาฝาก ฯลฯ มีโอกาสที่การพบเห็นตัวค่อนข้างยาก จึงมีค่าความชุกชุมน้อยกว่า

- * พฤติกรรมการร้องเพื่อประกาศเขตแดน หรือเกี้ยวพาราสีของนก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สามารถติดตามจนพบตัว หรือการจำแนกชนิดจากเสียงร้องของนกได้ ทำให้นกในกลุ่มนี้มีความชุกชุมหรือค่อนข้างมาก เช่น นกหัวว่า เป็นนกที่หากินตามพื้นดินโอกาสเห็นตัวได้ยาก แต่สามารถคำนวณหาค่าความชุกชุมได้สูง เนื่องจากใช้การบันทึกเสียงร้องเป็นการปรากฏของนก เช่นเดียวกับกลุ่มนกโพระดก นกคัคคู นกกินแมลง นกคอสามสี และนกแต้วแล้ว ฯลฯ สามารถติดตามและบันทึกการปรากฏได้จากเสียงร้อง

- * พฤติกรรมในการดำรงชีวิต เช่น การหาอยู่รวมกันเป็นฝูง เช่น นกแว่นตาขาว นกเงือกปากดำ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถพบนกในกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น จึงมีผลต่อการหาความชุกชุมเช่นกัน

- * พฤติกรรมในการเลือกแหล่งอาศัยหากิน พบว่านกที่มีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ และใกล้จะสูญพันธุ์ ยิ่ง ที่มีค่าความชุกชุม มักมีแหล่งอาศัยในป่าที่ราบต่ำ (ระดับความสูงต่ำกว่า 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ซึ่งมีพื้นที่เพียง ร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่าบาลา จึงนับว่าป่าบาลามีความสำคัญต่อการเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกที่มีความสำคัญ (importance bird area) ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ป่าดงดิบที่ราบต่ำในภาคใต้มีเนื้อที่จำกัดลดลงมาก

- การกระจายของพรรณไม้ที่พืชอาหารของนกมีความสัมพันธ์กับการปรากฏของนก โดยเฉพาะนกที่มีขนาดใหญ่และกินผลไม้ป่าเป็นอาหาร เช่น นกเงือก ในเส้นทางสำรวจ 11 เส้น พบไพร่ที่เป็นอาหารหลักของนกเงือก 42 ต้น จึงทำให้มีโอกาสพบนกเงือก โดยเฉพาะนกเงือกหัวแรด นกชนหินซึ่งเป็นนกที่มีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ แต่มีค่าความชุกชุมมาก และค่อนข้างมากตามลำดับ

- การพบนกเงือก 10 ชนิดจากจำนวน 13 ชนิดที่มีรายงานในประเทศไทย แสดงให้เห็นความสมบูรณ์สมบูรณ์ของป่าบาลา เนื่องจากนกเงือกจัดเป็น สัตว์บ่งชี้คุณภาพของระบบนิเวศน์ป่าดงดิบ

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
1	นกยางลายเสือ	<i>Gorsachius melanolophus</i>	16.67	0.11	UC	R ,NT
2	เหยี่ยวนกเขาหงอน	<i>Accipiter trivirgatus</i>	33.33	0.23	MC	R
3	เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น	<i>Accipiter gularis</i>	16.67	0.11	UC	P
4	เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	33.33	0.23	MC	R ,CR
5	เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา	<i>Ichthyophaga humilis</i>	66.67	0.45	C	R ,EN
6	เหยี่ยวรุ้ง	<i>Spilornis cheela</i>	100.00	0.68	A	R
7	เหยี่ยวต่างสี	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	16.67	0.11	UC	R
8	เหยี่ยวดำท้องขาว	<i>Spizaetus alboniger</i>	50.00	0.34	MC	R
9	เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว	<i>Spizaetus nanus</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
10	เหยี่ยวท้องแดง	<i>Hieraaetus kienerii</i>	16.67	0.11	UC	R
11	นกอินทรีดำ	<i>Ictinaetus malayensis</i>	16.67	0.11	UC	R ,NT
12	เหยี่ยวแมลงปอขาดำ	<i>Microhierax fringillarius</i>	100.00	0.68	A	R
13	เหยี่ยวคางคาว	<i>Macheiramphus alcinus</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
14	ไก่ป่า	<i>Gallus gallus</i>	33.33	0.23	MC	R
15	นกหว่า	<i>Argusianus argus</i>	100.00	0.68	A	R ,EN
16	ไก่จุก	<i>Rollulus rouloul</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
17	นกกระทาสองเดือย	<i>Caloperdix ocella</i>	33.33	0.23	MC	R ,VU
18	นกคุ้มสี	<i>Coturnix chinensis</i>	33.33	0.23	MC	R ,NT
19	นกอี๊ดชันป่าเขาแดง	<i>Rallina fasciata</i>	33.33	0.23	MC	R
20	นกกวัก	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	50.00	0.34	MC	R
21	นกเป็ล้าธรรมดา	<i>Treron curvirostra</i>	100.00	0.68	A	R
22	นกเป็ล้าเล็กหัวเทา	<i>Treron olax</i>	50.00	0.34	MC	R ,EN
23	นกเป็ล้าใหญ่	<i>Treron capellei</i>	16.67	0.11	UC	R ,CR
24	นกเป็ล้าหน้าแดง	<i>Ptilinopus jambu</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN
25	นกเขาใหญ่	<i>Streptopelia chinensis</i>	83.33	0.56	C	R
26	นกเขาเขียว	<i>Chalcophaps indica</i>	100.00	0.68	A	R
27	นกหกใหญ่	<i>Psittinus cyanurus</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
28	นกหกเล็กปากดำ	<i>Lariculus galgulus</i>	66.67	0.56	C	R
29	นกคัคคูเหยี่ยวหงอน	<i>Clamator coromandus</i>	33.33	0.23	MC	B

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
30	นกคัคคูเหี่ยวเล็ก	<i>Hierococcyx vagans</i>	16.67	0.11	UC	R
31	นกคัคคูเหี่ยวอกแดง	<i>Hierococcyx fugax</i>	16.67	0.11	UC	R
32	นกคัคคูพันธุ์อินเดีย	<i>Cuculus micropterus</i>	66.67	0.45	C	R
33	นกคัคคูลาย	<i>Cacomantis sonneratii</i>	33.33	0.23	MC	R
34	นกอีวาบตักแตน	<i>Cacomantis merulinus</i>	66.67	0.45	C	R
35	นกคัคคูหางแพน	<i>Cacomantis sepulcralis</i>	16.67	0.11	UC	R
36	นกคัคคูมรกต	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	16.67	0.11	UC	R
37	นกคัคคูสีม่วง	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>	33.33	0.23	MC	R
38	นกคัคคูสีทองแดง	<i>Chrysococcyx minutillus</i>	16.67	0.11	UC	R
39	นกคัคคูแซงแซว	<i>Surniculus lugubris</i>	33.33	0.23	MC	R
40	นกบั้งรอกเล็กท้องเทา	<i>Phaenicophaeus diardi</i>	33.33	0.23	MC	R
41	นกบั้งรอกเล็กท้องแดง	<i>Phaenicophaeus sumatranus</i>	50.00	0.34	MC	R
42	นกบั้งรอกใหญ่	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	33.33	0.34	MC	R
43	นกบั้งรอกแดง	<i>Phaenicophaeus chlorophaeus</i>	66.67	0.45	C	R
44	นกบั้งรอกปากแดง	<i>Phaenicophaeus javanicus</i>	33.33	0.23	MC	R
45	นกบั้งรอกเขียวอกแดง	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	50.00	0.34	MC	R
46	นกกระปูดใหญ่	<i>Centropus sinensis</i>	83.33	0.56	C	R
47	นกกระปูดเล็ก	<i>Centropus bengalensis</i>	33.33	0.23	MC	R
48	นกกระปูดนิ้วสั้น	<i>Centropus rectunguis</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
49	นกเค้าเหี่ยว	<i>Ninox scutulata</i>	33.33	0.23	MC	R
50	นกเค้าหน้าผากขาว	<i>Otus sagittatus</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN
51	นกเค้าแดง	<i>Otus rufescens</i>	66.67	0.45	C	R ,EN
52	นกฮูก, นกเค้ากู่	<i>Otus bakkamoena</i>	33.33	0.23	MC	R
53	นกเค้ากระ	<i>Glaucidium brodiei</i>	16.67	0.11	UC	R
54	นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา	<i>Bubo sumatranus</i>	33.33	0.23	MC	R ,VU
55	นกทืดท้อมลายู	<i>Ketupa ketupu</i>	50.00	0.34	MC	R
56	นกเค้าป่าหลังจุด	<i>Strix seloputo</i>	16.67	0.11	UC	R ,NT
57	นกปากกบปากซี่ใต้	<i>Batrachostomus stellatus</i>	16.67	0.11	UC	R, EN
58	นกปากกบพันธุ์ขาว	<i>Batrachostomus javensis</i>	50.00	0.34	MC	R ,VU

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
59	นกตบยุงพันธุ์มลายู	<i>Eurostopodus temminckii</i>	66.67	0.45	C	R
60	นกตบยุงหางยาว	<i>Caprimulgus macrurus</i>	66.67	0.45	C	R
61	นกขุนแผนท้ายทอยแดง	<i>Harpactes kasumba</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN
62	นกขุนแผนหัวดำ	<i>Harpactes diardii</i>	16.67	0.11	UC	R ,VU
63	นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล	<i>Harpactes orrhophaeus</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
64	นกขุนแผนตะโพกแดง	<i>Harpactes duvaucelii</i>	16.67	0.11	UC	R
65	นกขุนแผนอกสีส้ม	<i>Harpactes oreskios</i>	33.33	0.23	MC	R
66	นกขุนแผนหัวแดง	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	16.67	0.11	UC	R
67	นกกะเต็นน้อยธรรมดา	<i>Alcedo atthis</i>	50.00	0.34	MC	R
68	นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน	<i>Alcedo meninting</i>	16.67	0.11	UC	R
69	นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ	<i>Alcedo euryzona</i>	50.00	0.34	MC	R ,NT
70	นกกะเต็นน้อยหลังดำ	<i>Ceyx erithacus</i>	33.33	0.23	MC	R
71	นกกะเต็นน้อยหลังแดง	<i>Ceyx rufidorsus</i>	33.33	0.23	MC	R
72	นกกะเต็นลาย	<i>Lacedo pulchella</i>	33.33	0.23	MC	R
73	นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา	<i>Halcyon capensis</i>	16.67	0.11	UC	R
74	นกกะเต็นอกขาว	<i>Halcyon smyrnensis</i>	100.00	0.68	A	R
75	นกกะเต็นหัวดำ	<i>Halcyon pileata</i>	16.67	0.11	UC	W
76	นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล	<i>Actenoides concretus</i>	33.33	0.23	MC	R
77	นกจาบคาหัวสีส้ม	<i>Merops leschenaulti</i>	83.33	0.56	C	R
78	นกจาบคาหัวเขียว	<i>Merops philippinus</i>	33.33	0.23	MC	W
79	นกจาบคาคอสีฟ้า	<i>Merops viridis</i>	33.33	0.23	MC	R
80	นกจาบคาเคราแดง	<i>Nyctornis amictus</i>	66.67	0.45	C	R
81	นกตะขาบแดง	<i>Eurystomus orientalis</i>	33.33	0.23	MC	R
82	นกเงือกหัวหงอก	<i>Aceros comatus</i>	16.67	11	UC	R ,VU
83	นกเงือกปากดำ	<i>Anorrhinus galeritus</i>	83.33	0.56	C	R, NT
84	นกเงือกปากย่น	<i>Aceros corrugatus</i>	16.67	0.11	UC	R ,CR
85	นกเงือกกรามช้าง	<i>Aceros undulatus</i>	83.33	0.56	C	R ,NT
86	นกเงือกกรามช้างปากเรียบ	<i>Aceros subruficollis</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN
87	นกเงือกดำ	<i>Anthraceros malayanus</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
88	นกแก๊ก	<i>A. albirostris convexus</i>	16.67	0.11	UC	R ,NT
89	นกเงือกหัวแรด	<i>Buceros rhinoceros</i>	100.00	0.68	A	R ,EN
90	นกกก, นกกากยัง	<i>Buceros bicornis</i>	33.33	0.23	MC	R ,NT
91	นกชนหิน	<i>Buceros vigil</i>	83.33	0.56	C	R ,EN
92	นกโพระดกเคราเหลือง	<i>Megalaima chrysopogon</i>	83.33	0.56	C	R
93	นกโพระดกหลากสี	<i>Megalaima rafflesii</i>	66.67	0.45	C	R ,EN
94	นกโพระดกคางแดง	<i>Megalaima mystacophanos</i>	83.33	0.56	C	R
95	นกโพระดกหัวเหลือง	<i>Megalaima henricii</i>	50.00	0.34	MC	R
96	นกโพระดกหน้าผากดำ	<i>Megalaima australis</i>	66.67	0.45	C	R
97	นกตีทอง	<i>Megalaima haemacephala</i>	50.00	0.34	MC	R
98	นกโพระดกหนวดแดง	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	16.67	0.11	UC	R
99	นกจอกป่าหัวโต	<i>Calorhamphus fuliginosus</i>	83.33	0.56	C	R
100	นกพรานผึ้ง	<i>Indicator archipelagicus</i>	33.33	0.23	MC	R ,VU
101	นกหัวขวานจิ้งจอกแดง	<i>Sasia abnormis</i>	66.67	0.45	C	R
102	นกหัวขวานหลังสีส้ม	<i>Reinwardtipicus validus</i>	33.33	0.23	MC	R ,NT
103	นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล	<i>Dinopium rafflesii</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
104	นกหัวขวานป่าไผ่	<i>Gecinulus viridis</i>	33.33	0.23	MC	R
105	นกหัวขวานแดงลาย	<i>Picus miniaceus</i>	33.33	0.23	MC	R
106	นกหัวขวานปีกแดง	<i>Picus puniceus</i>	16.67	0.11	UC	R
107	นกหัวขวานคอลาย	<i>Picus mentalis</i>	50.00	0.34	MC	R
108	นกหัวขวานสีตาล	<i>Celeus brachyurus</i>	33.33	0.23	MC	R
109	นกหัวขวานแดง	<i>Blythipicus rubiginosus</i>	33.33	0.23	MC	R
110	นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง	<i>Meiglyptes tristis</i>	16.67	0.11	UC	R
111	นกหัวขวานลายคอแถบขาว	<i>Meiglyptes tukki</i>	50.00	0.34	MC	R
112	นกหัวขวานแคระอกเทา	<i>Hemicircus concretus</i>	33.33	0.23	MC	R
113	นกหัวขวานต่างแคระ	<i>Dendrocopus canicapillus</i>	33.33	0.23	MC	R
114	นกพญาปากกว้างสีดำ	<i>Corydon sumatranus</i>	33.33	0.23	MC	R
115	นกพญาปากกว้างท้องแดง	<i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i>	33.33	0.23	MC	R ,VU
116	นกพญาปากกว้างลายเหลือง	<i>Eurylaimus javanicus</i>	50.00	0.34	MC	R

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
117	นกพญาปากกว้างเล็ก	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	66.67	0.45	C	R
118	นกพญาปากกว้างอกสีเงิน	<i>Serilophus lunatus</i>	66.67	0.45	C	R
119	นกเขียวปากงุ้ม	<i>Calyptomena viridis</i>	33.33	0.23	MC	R
120	นกแก้วแล้วยักษ์	<i>Pitta caerulea</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
121	นกแก้วแล้วแดงมลายู	<i>Pitta granatina</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
122	นกแก้วแล้วอกเขียว	<i>Pitta sordida</i>	33.33	0.23	MC	B
123	นกแก้วแล้วลาย	<i>Pitta guajana</i>	33.33	0.23	MC	R
124	นกแอ่นกินรัง	<i>Collocalia fuciphaga</i>	16.67	0.11	UC	R ,NT
125	นกแอ่นท้องขาว	<i>Collocalia esculenta</i>	33.33	0.23	MC	R
126	นกแอ่นตาล	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	66.67	0.45	C	R
127	นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว	<i>Rhaphidura leucopygialis</i>	83.33	0.56	C	R
128	นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก	<i>Apus pacificus</i>	50.00	0.34	MC	R
129	นกแอ่นบ้าน	<i>Apus affinis</i>	66.67	0.45	C	R
130	นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว	<i>Hirundoapus giganteus</i>	33.33	0.23	MC	R
131	นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา	<i>Hemiprocne longipennis</i>	100.00	0.68	A	R
132	นกแอ่นฟ้าเคราขาว	<i>Hemiprocne comata</i>	100.00	0.68	A	R
133	นกนางแอ่นบ้าน	<i>Hirundo rustica</i>	83.33	0.56	C	W
134	นกนางแอ่นแปซิฟิก	<i>Hirundo tahitica</i>	66.67	0.45	C	R
135	นกนางแอ่นตะโพกแดง	<i>Hirundo daurica</i>	33.33	0.23	MC	W
136	นกนางแอ่นลาย	<i>Hirundo striolata</i>	33.33	0.23	MC	R
137	นกเด้าดินทุ่ง	<i>Anthus richardi</i>	66.67	0.45	C	W
138	นกอุ้มบาตร	<i>Montacilla alba</i>	66.67	0.45	C	W
139	นกเด้าลมหลังเทา	<i>Montacilla cinerea</i>	66.67	0.45	C	W
140	นกเด้าลมดง	<i>Dendronanthus indicus</i>	66.67	0.45	C	W
141	นกเขนน้อยปีกแถบขาว	<i>Hemipus picatus</i>	83.33	0.56	C	R
142	นกเขนน้อยปีกดำ	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	66.67	0.45	C	R ,EN
143	นกเงี้ยวดงหางสีน้ำตาล	<i>Tephrodornis gularis</i>	33.33	0.23	MC	R
144	นกเงี้ยวม้งเล็ก	<i>Coracina fimbriata</i>	66.67	0.45	C	R
145	นกขี้เถ้าลายขวาง	<i>Coracina striata</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
146	นกพญาไฟสีเทา	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	33.33	0.23	MC	W
147	นกพญาไฟเล็กคอดำ	<i>Pericrocotus igneus</i>	16.67	0.11	UC	R ,VU
148	นกพญาไฟใหญ่	<i>Pericrocotus flammeus</i>	83.33	0.56	C	R
149	นกขมิ้นน้อยสีเขียว	<i>Aegithina viridissima</i>	66.67	0.45	C	R
150	นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว	<i>Aegithina lafresnayei</i>	50.00	0.34	MC	R
152	นกเขียวก้านทองใหญ่	<i>Chloropsis sonnerati</i>	50.00	0.34	MC	R
153	นกเขียวก้านทองปีกสีฟ้า	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	100.00	0.68	A	R
154	นกปรอดแม่ทะ	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	16.67	0.11	UC	R ,CR
155	นกปรอดทอง	<i>Pycnonotus atriceps</i>	83.33	0.56	C	R
156	นกปรอดเหลืองหัวจุก	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	83.33	0.56	C	R
157	นกปรอดดำปีกขาว	<i>Pycnonotus melanoleucus</i>	16.67	0.11	UC	R ,NT
158	นกปรอดอกลายเกล็ด	<i>Pycnonotus squamatus</i>	33.33	0.23	UC	R
159	นกปรอดท้องสีเทา	<i>Pycnonotus cyaniventris</i>	66.67	0.45	C	R
160	นกปรอดหงอนหลังลาย	<i>Pycnonotus eutilotus</i>	33.33	0.23	MC	R ,NT
161	นกปรอดคอกลาย	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	100.00	0.68	A	R
162	นกปรอดหน้าขาว	<i>Pycnonotus goiavier</i>	83.33	0.56	C	R
163	นกปรอดสวน	<i>Pycnonotus blanfordi</i>	83.33	0.56	C	R
164	นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว	<i>Pycnonotus simplex</i>	100.00	0.68	A	R
165	นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง	<i>Pycnonotus brunneus</i>	100.00	0.68	A	R
166	นกปรอดเล็กท้องขาว	<i>Pycnonotus erythrophthalmos</i>	83.33	0.56	C	R
167	นกปรอดโองท้องสีน้ำตาล	<i>Alophoixus ochraceus</i>	83.33	0.56	C	R
168	นกปรอดโองแก้มเทา	<i>Alophoixus bres</i>	83.33	0.56	C	R
169	นกปรอดโองไร้มอง	<i>Alophoixus phaeocephalus</i>	83.33	0.56	C	R
170	นกปรอดสีคอได้คอกเหลือง	<i>Alophoixus finschii</i>	66.67	0.45	C	R ,VU
171	นกปรอดหลังฟู	<i>Tricholestes criniger</i>	83.33	0.56	C	R
172	นกปรอดหงอนตาขาว	<i>Iole olivacea</i>	83.33	0.56	C	R
173	นกปรอดหลังเขียวอกลาย	<i>Ixos malaccensis</i>	33.33	0.23	MC	R
174	นกปรอดสีขี้เถ้า	<i>Hemixos flava</i>	33.33	0.23	MC	R
175	นกแซงแซวสีเทา	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	50.00	0.23	MC	R

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
176	นกแขวงแขวหางปลา	<i>Dicrurus macrocercus</i>	33.33	0.23	MC	R
177	นกแขวงแขวปากกา	<i>Dicrurus annectans</i>	33.33	0.23	MC	W
178	นกแขวงแขวเล็กเหลือบ	<i>Dicrurus aeneus</i>	83.33	0.56	C	R
179	นกแขวงแขวหางปวงเล็ก	<i>Dicrurus remifer</i>	66.67	0.45	C	R
180	นกแขวงแขวหางปวงใหญ่	<i>Dicrurus paradiseus</i>	100.00	0.68	A	R
181	นกขมิ้นหัวดำเล็ก	<i>Oriolus xanthonotus</i>	33.33	0.23	MC	R ,NT
182	นกขมิ้นหัวดำใหญ่	<i>Oriolus xanthornus</i>	16.67	0.11	UC	R
183	นกเขี้ยวคราม	<i>Irena puella</i>	100.00	0.68	A	R
184	นกกาน้อยหงอนยาว	<i>Platylophus galericulatus</i>	33.33	0.11	MC	R
185	นกกาน้อยแถบปีกขาว	<i>Platysmus leucopterus</i>	33.33	0.11	MC	R ,VU
186	อีกา	<i>Corvus macrorhynchos</i>	83.33	0.56	C	R
187	นกตีดสุลต่าน	<i>Melanochlora sultanea</i>	66.67	0.45	C	R
188	นกไต่ไม้หน้าผากก้ามเหยี่	<i>Sitta frontalis</i>	66.67	0.45	C	R
190	นกจาบดินหัวดำ	<i>Pellorneum capistratum</i>	50.00	0.34	MC	R
191	นกกินแมลงป่าหางสั้น	<i>Malacocincla malaccensis</i>	50.00	0.34	MC	R
192	นกกินแมลงป่าโกงกาง	<i>Trichastoma rostratum</i>	33.33	0.23	MC	R ,VU
193	นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง	<i>Trichastoma bicolor</i>	66.67	0.45	C	R ,VU
194	นกกินแมลงปากหนา	<i>Malacocincla sepiarium</i>	66.67	0.45	C	R ,EN
195	นกกินแมลงป่าฝน	<i>Malacocincla abbotti</i>	66.67	0.45	C	R
196	นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล	<i>Malacopteron magnirostre</i>	83.33	0.56	C	R
197	นกกินแมลงหัวสีคล้ำ	<i>Malacopteron affine</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
198	นกกินแมลงหัวแดงเล็ก	<i>Malacopteron cinereum</i>	66.67	0.45	C	R
199	นกกินแมลงหัวแดงใหญ่	<i>Malacopteron magnum</i>	66.67	0.45	C	R ,VU
200	นกกระวังไพรหลังแดง	<i>Pomatorhinus montanus</i>	16.67	0.11	UC	R
201	นกจู่เต็นตีนใหญ่	<i>Napothera macrodactyla</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
202	นกกินแมลงคอเทา	<i>Stachyris nigriceps</i>	66.67	0.45	C	R
203	นกกินแมลงตาขาว	<i>Stachyris poliocephala</i>	66.67	0.45	C	R
204	นกกินแมลงตะโพกแดง	<i>Stachyris maculata</i>	66.67	0.45	C	R ,VU
205	นกกินแมลงหูขาว	<i>Stachyris leucotis</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
206	นกกินแมลงคอดำ	<i>Stachyris nigrocollis</i>	33.33	0.23	MC	R ,VU
207	นกกินแมลงปีกแดง	<i>Stachyris erythroptera</i>	66.67	0.45	C	R
208	นกกินแมลงอกเหลือง	<i>Macronous gularis</i>	100.00	0.68	A	R
209	นกกินแมลงหลังฟู	<i>Macronous ptilosus</i>	66.67	0.45	C	R ,VU
210	นกมุ่นรกสีน้ำตาล	<i>Alcippe brunneicauda</i>	83.33	0.56	C	R
211	นกภูหอนท้องขาว	<i>Yuhina zantholeuca</i>	83.33	0.68	C	R
212	นกคอสามสี	<i>Eupetes macrocerus</i>	67.67	0.45	C	R ,VU
213	นกกระจอยป่าโกงกาง	<i>Gerygone sulphurea</i>	67.67	0.45	C	R
214	นกกระจอยคอขาว	<i>Abroscopus superciliaris</i>	50.00	0.34	MC	R
215	นกกระจิตขาสีเนื้อ	<i>Phylloscopus borealis</i>	33.33	0.34	MC	W
216	นกกระจิตหัวโลกเหนือ	<i>Phylloscopus borealis</i>	50.00	0.34	MC	W
217	นกกระจิตหัวมงกุฎ	<i>Phylloscopus coronatus</i>	33.33	0.23	MC	W
218	นกกระจับหญ้าสีข้างแดง	<i>Prinia rufescens</i>	100.00	0.68	A	R
219	นกกระจับหญ้าท้องเหลือง	<i>Prinia flaviventris</i>	67.67	0.45	C	R
220	นกกระจับธรรมดา	<i>Orthotomus sutorius</i>	100.00	0.68	A	R
221	นกกระจับคอดำ	<i>Orthotomus atrogularis</i>	83.33	0.56	C	R
222	นกกระจับกระหม่อมแดง	<i>Orthotomus sericeus</i>	83.33	0.56	C	R
223	นกเขนน้อยไซบีเรีย	<i>Luscinia cyane</i>	50.00	0.34	MC	W
224	นกทางเขนบ้าน	<i>Copsychus saularis</i>	100.00	0.68	A	R
225	นกทางเขนดง	<i>Copsychus malabaricus</i>	100.00	0.68	A	R
226	นกทางเขนดงหางแดง	<i>Trichixos pyrropyga</i>	66.67	0.45	C	R ,EN
227	นกทางเขนน้ำหลังแดง	<i>Enicurus ruficapillus</i>	83.33	0.56	C	R
228	นกกระเบื้องคอขาว	<i>Monticola gularis</i>	33.33	0.23	MC	W
229	นกกระเบื้องผา	<i>Monticola solitarius</i>	50.00	0.34	MC	W
230	นกเอี้ยงถ้ำ	<i>Myophonus caeruleus</i>	33.33	0.23	MC	R
231	นกเดินดงหัวสีน้ำตาลแดง	<i>Zoothera interpres</i>	16.67	0.11	UC	R ,VU
232	นกเดินดงหัวสีส้ม	<i>Zoothera citrina</i>	50.00	0.34	MC	B,W
233	นกจับแมลงอกสีเนื้อ	<i>Rhinomyias olivacea</i>	16.67	0.11	UC	R
234	นกจับแมลงอกเทา	<i>Rhinomyias umbratilis</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
235	นกจับแมลงสีคล้ำ	<i>Muscicapa sibirica</i>	33.33	0.23	MC	W
236	นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง	<i>Muscicapa ferruginea</i>	33.33	0.23	MC	P
237	นกจับแมลงสีน้ำตาล	<i>Muscicapa dauurica</i>	66.67	0.45	C	W
238	นกจับแมลงสีน้ำตาลทองลาย	<i>Muscicapa williamsoni</i>	16.67	0.11	UC	W
239	นกจับแมลงตะโพกเหลือง	<i>Ficedula zanthopygia</i>	33.33	0.23	MC	P
240	นกจับแมลงอกสีส้ม	<i>Ficedula dumetoria</i>	33.33	0.23	MC	R ,EN
241	นกจับแมลงหัวเทา	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	66.67	0.45	C	R
242	นกจับแมลงสีฟ้า	<i>Eumyias thalassina</i>	66.67	0.45	C	R
243	นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน	<i>Cyornis unicolor</i>	50.00	0.34	MC	R
244	นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว	<i>Cyornis concreta</i>	66.67	0.45	C	R ,NT
245	นกจับแมลงอกส้มท้องขาว	<i>Cyornis tickelliae</i>	83.33	0.56	C	R
246	นกอีแพรดทองลาย	<i>Rhipidura perlata</i>	50.00	0.34	MC	R ,EN
247	นกจับแมลงจุกดำ	<i>Hypothymis azurea</i>	66.67	0.45	C	R
248	นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง	<i>Philentoma pyrhoptrum</i>	66.67	0.45	C	R
249	นกจับแมลงอกแดง	<i>Philentoma velatum</i>	16.67	0.11	UC	R
250	นกแซวสวรรค์หางดำ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	16.67	0.11	UC	P ,NT
251	นกแซวสวรรค์	<i>Terpsiphone paradisi</i>	66.67	0.45	C	R
252	นกอีเสือสีน้ำตาล	<i>Lanius cristatus</i>	50.00	0.34	MC	W
253	นกอีเสือลายเสือ	<i>Lanius tigrinus</i>	33.33	0.23	MC	P
254	นกเอี้ยงดำปีกขนใต้	<i>Aplonis panayensis</i>	66.67	0.45	C	R
255	นกเอี้ยงสาริกา	<i>Acridotheres tristis</i>	83.33	0.56	C	R
256	นกขุนทอง	<i>Gracula religiosa</i>	16.67	0.11	UC	R ,EN
257	นกกินปลีสีเรียบ	<i>Anthreptes simplex</i>	50.00	0.34	MC	R
258	นกกินปลีคอสีน้ำตาล	<i>Anthreptes malacensis</i>	50.00	0.34	MC	R
259	นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง	<i>Anthreptes rhodolaema</i>	33.33	0.34	MC	R
260	นกกินปลีแก้มสีทับทิม	<i>Anthreptes singalensis</i>	50.00	0.34	MC	R
261	นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน	<i>Hypogramma hypogrammicum</i>	66.67	0.45	C	R
262	นกกินปลีคอสีทองแดง	<i>Nectarinia calcostetha</i>	33.33	0.23	MC	R
263	นกกินปลีอกเหลือง	<i>Nectarinia jugularis</i>	66.67	0.45	C	R

ตารางที่ 1 ชนิดและความชุกชุมของนกในป่าบาลา (ต่อ)

ลำดับที่	ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	A	RA	ความ ชุกชุม	สถานะภาพ IUCN
264	นกกินปลีคอแดง	<i>Aethopyga siparaja</i>	33.33	0.23	MC	R
265	นกกินปลีแดง	<i>Aethopyga temminckii</i>	16.67	0.11	UC	R ,VU
266	นกปลีกล้วยเล็ก	<i>Arachnothera longirostra</i>	100.00	0.68	A	R
267	นกปลีกล้วยปากหนา	<i>Arachnothera crassirostris</i>	50.00	0.34	MC	R
268	นกปลีกล้วยปากยาว	<i>Arachnothera robusta</i>	66.67	0.45	C	R ,VU
269	นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่	<i>Arachnothera flavigaster</i>	33.33	0.23	MC	R ,VU
270	นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก	<i>Arachnothera chrysogenys</i>	50.00	0.34	MC	R
271	นกปลีกล้วยท้องเทา	<i>Arachnothera affinis</i>	66.67	0.56	C	R
272	นกกาฝากอกแดง	<i>Prionochilus thoracicus</i>	50.00	0.34	MC	R ,VU
273	นกกาฝากอกสีเลือดหมู	<i>Prionochilus percussus</i>	33.33	0.23	MC	R
274	นกกาฝากอกเหลือง	<i>Prionochilus maculatus</i>	83.33	0.56	C	R
275	นกกาฝากปากหนา	<i>Dicaeum agile</i>	83.33	0.56	C	R
276	นกกาฝากกันเหลือง	<i>Dicaeum chrysorrheum</i>	66.67	0.45	C	R
277	นกกาฝากท้องสีส้ม	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	66.67	0.45	C	R
278	นกสีชมพูสวน	<i>Dicaeum cruentatum</i>	83.33	0.56	C	R
279	นกแว่นตาขาวสีทอง	<i>Zosterops palpebrosus</i>	33.33	0.23	MC	R
280	นกแว่นตาขาวสีเหลืองปากดำ	<i>Zosterops everetti</i>	100.00	0.68	A	R
281	นกกระจอกบ้าน	<i>Passer montanus</i>	83.33	0.56	A	R
282	นกกระติ๊ดตะโพกขาว	<i>Lonchura striata</i>	50.00	0.34	MC	R
283	นกกระติ๊ดท้องขาว	<i>Lonchura leucogastra</i>	66.67	0.45	C	R
284	นกกระติ๊ดขี้หมู	<i>Lonchura punctulata</i>	83.33	0.56	C	R
285	นกกระติ๊ดสีอิฐ	<i>Lonchura malacca</i>	33.33	0.23	MC	R
286	นกกระติ๊ดหัวขาว	<i>Lonchura maja</i>	50.00	0.34	MC	R

เอกสารอ้างอิง

สุธี ศุภราชวิกร. 2543. นกใหม่ในประเทศไทย . สำนักพิมพ์wana กรุงเทพฯ.

Lekagul, B. and P. D. Round. 1991. A Guide to the Birds of Thailand. Saha Karn Bhaet Co. Ltd.
Bangkok.

Pettingill, O. S. 1950. A Laboratory and Field Manual of Ornithology. Burgess Publ. Co. Mennesota.

Robson, Craig. 2000. A Field Guide to the Birds of Thailand and South-east Asia . Asia Book Co. Ltd.
Bangkok .

Round, P.D. 1997. List of the Birds in Hala-Bala Wildlife Sanctuary. Wildlife Conservation Center ,
Mahidol University. (เอกสารโรเนียว)